herpy

LEGUANER

Smooth Helmeted Iguana

Corytophanes cristatus

Corytophanes cristatus er en langbenet, trælevende øgle fra regnskovene i Mellem- og Sydamerika med en høj, hjelmlignende kam på baghovedet og en savtakket kam ned langs ryggen. Den sidder ubevægelig i timevis og lurer på store insekter, skifter farve mellem grå, olivenbrun og rødbrun og er meget sky. Den kræver et højt, fugtigt terrarie, UVB, levende foder og ro.

Familie: Corytophanidae Tidligere navn: *Agama cristata*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**25-35 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-8 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 45 × 90 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**27-30 °C**
Hotspot	**32-35 °C**
Temperatur, nat	**21-24 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**4-11 æg**
Inkubation	**60-90 dage** ved 26-28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står hverken på CITES-listerne eller i EU's bilag A-D. Ingen leguanlignende arter står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015).

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et enkelt voksent dyr skal have et højt terrarie på mindst 60 × 45 × 90 cm (længde × bredde × højde). Større er bedre, især bredere.
TEMPERATUR	Luften skal holde 27-30 °C om dagen, og den varmeste plads, en tyk gren under en lampe, skal have en overfladetemperatur på 32-35 °C målt med et infrarødt termometer. Den køligste del af terrariet nederst er 24-27 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være 60-70 % om dagen og stige til 70-80 % om natten.
LYS OG UVB	*Corytophanes cristatus* er dagaktiv og skal have UVB hele dagen, selv om den er en skyggeart. UVB-lampen skal give Ferguson-zone 1, dvs. et lavt UV-indeks på de højeste grene og næsten intet nede i terrariet.
FODER	Arten er insektæder og tager store, langsomme byttedyr: kakerlakker (fx discoider og dubia), silkeorme, hornorme, græshopper, superorme og regnorme. Foderdyret skal være omkring lige så stort som dyrets hoved.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er sky og fredelig, men følsom over for forstyrrelser, og den egner sig bedre til at studere end til at håndtere. Den sidder tit helt stille i timevis og bevæger sig langsomt.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Mexico, Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama og Colombia.