herpy

LEGUANER

Hernandez's Helmeted Basilisk

Corytophanes hernandesii

Corytophanes hernandesii er en slank, trælevende øgle fra skovene i det sydlige Mexico, Belize, Guatemala og Honduras med en kantet, benet hjelm på hovedet. Den sidder ubevægelig i timevis og lurer på store insekter, skifter farve fra brun til gul, orange og næsten sort, og den er meget sky. Den kræver et højt, fugtigt terrarie, UVB, store levende foderdyr og ro.

Familie: Corytophanidae Tidligere navn: *Chamaeleopsis hernandesii; Corytophanes chamaeleopsis; Corytophanes hernandezii; Corytophanes mexicanus*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**25-35 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-8 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Tørskov og regnskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 45 × 90 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**26-30 °C**
Hotspot	**32-35 °C**
Temperatur, nat	**21-24 °C**
Luftfugtighed	**60-90 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**3-11 æg**
Inkubation	**90 dage** ved 26 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står hverken på CITES-listerne eller i EU's bilag A-D og er ikke på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015).

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et enkelt voksent dyr skal have et højt terrarie på mindst 60 × 45 × 90 cm (længde × bredde × højde). Større er bedre, især bredere.
TEMPERATUR	Luften skal holde 26-30 °C om dagen, og den varmeste plads, en tyk gren under en lampe, skal have en overfladetemperatur på 32-35 °C målt med et infrarødt termometer. Den køligste del af terrariet nederst er 24-27 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være 60-90 %, lavest midt på dagen og højest efter forstøvning og om natten.
LYS OG UVB	*Corytophanes hernandesii* er dagaktiv og skal have UVB hele dagen, selv om den er en skyggeart. UVB-lampen skal give Ferguson-zone 1, dvs. et lavt UV-indeks på de højeste grene og næsten intet nede i terrariet.
FODER	Arten er insektæder og tager store, langsomme byttedyr: kakerlakker (fx discoider og dubia), silkeorme, hornorme, græshopper, superorme og regnorme.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er sky og fredelig, men følsom over for forstyrrelser, og den egner sig bedre til at studere end til at håndtere. Den sidder tit helt stille i timevis og bevæger sig langsomt.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Mexico, Belize, Guatemala og Honduras.