herpy

LEGUANER

Serrated Casquehead Iguana

Laemanctus serratus

Laemanctus serratus er en ekstremt slank, trælevende øgle fra skovene i det østlige Mexico og Mellemamerika. Den har lange ben, en endnu længere hale, en lille, bagudrettet hjelm med takket bagkant og en savtakket kam ned langs ryggen. Den er dagaktiv og æder insekter. Pasningen er næsten ikke beskrevet og bygger på levestedet og på den beslægtede *Corytophanes cristatus*.

Familie: Corytophanidae Tidligere navn: *Laemanctus alticoronatus*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**70 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-8 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Tørskov og regnskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**100 × 50 × 120 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**27-30 °C**
Hotspot	**32-35 °C**
Temperatur, nat	**21-24 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**3-5 æg**
Inkubation	**60-90 dage** ved 26-28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står hverken på CITES-listerne eller i EU's bilag A-D. Ingen leguanlignende arter står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015).

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der findes meget lidt viden om pasningen af *Laemanctus serratus*. Pasningen bygger derfor på levestedet (skov i varmt klima, træer og buske) og på *Corytophanes cristatus*, som er nærmeste og bedre kendte slægtning i terrarium.

TEMPERATUR
Arten er dagaktiv og lever i varm skov. Luften skal holde 27-30 °C om dagen, og solpladsen, en tyk gren under en lampe, skal have en overfladetemperatur på 32-35 °C målt med et infrarødt termometer.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal være 60-70 % om dagen og stige til 70-80 % om natten. Tallet er lånt fra *Corytophanes cristatus*.

LYS OG UVB
Laemanctus serratus er dagaktiv og skal have UVB hele dagen. Ferguson-zone 2 er et skøn ud fra levevis, ikke en måling: arten sidder i træer og buske og er ikke en udpræget solbader.

FODER
Arten er insektæder. Giv kakerlakker (fx discoider og dubia), græshopper, fårekyllinger, silkeorme, hornorme og superorme, og af og til regnorme. Foderdyret skal være højst lige så stort som dyrets hoved.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Arten er ikke et dyr til håndtering, og hvordan den reagerer på forstyrrelser, er ikke dokumenteret. Slægtningen *Corytophanes cristatus* er sky og følsom, så gå roligt til og fra terrariet, og lad dyret være i fred under fodring.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Mexico, Belize, Guatemala og Honduras.