herpy

LEGUANER

Giant horned lizard

Phrynosoma asio

Phrynosoma asio er den største og mest slanke af hornfirbenene. Den lever i de tørre skove langs Stillehavet i det sydlige Mexico, bliver op til 12 cm fra snude til kloak og har en længere hale og en mere øglelignende krop end sine nordlige slægtninge. Den er dagaktiv, æder mange slags insekter og holder en lang hvileperiode i tørtiden.

Familie: Phrynosomatidae Tidligere navn: *Phrynosoma spinimentum*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**10-12 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**7-13 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Halvørken og tørskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 50 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**27-30 °C**
Hotspot	**38-42 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**30-60 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Vinterhvile	**18-20 °C** 20-26 uger
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**13-16 æg**
Kuld pr. år	**1**
Inkubation	**77-84 dage** ved 30-32 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Slægten *Phrynosoma* står på CITES liste II (siden 23.2.2023) og i EU's bilag B. Handel over EU's grænse kræver CITES-papirer, og dyrets lovlige oprindelse skal kunne dokumenteres, så få papirer med ved køb. CITES-tilladelser og -certifikater udstedes i Danmark af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Arten står ikke på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Phrynosoma asio*, men voksne dyr er forholdsvis lette at holde, fordi de æder almindelige foderdyr. Temperatur og lys bygger på *Phrynosoma cornutum*, som er bedre kendt i fangenskab.
TEMPERATUR	Arten har brug for en solplads, hvor overfladen når 38-42 °C, målt med et infrarødt termometer. Resten af terrariet skal være 27-30 °C om dagen, så øglen selv kan vælge, hvor længe den vil ligge i varmen.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Arten kommer fra et klima med en våd sommer og en tør vinter, og pasningen skal følge den rytme. Luftfugtigheden er ikke dokumenteret; 30-60 % i den aktive periode er et skøn ud fra klimaet.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og har brug for kraftigt lys og UVB i den aktive periode. Brug et UVB-rør (Ferguson-zone 3, T5 HO 10-14 %) eller en kombineret UVB-metaldamplampe over solpladsen. Zonen er lånt fra *P. cornutum*.
FODER	Voksne *Phrynosoma asio* æder villigt og med stor appetit mange slags insekter. Giv især fårekyllinger, græshopper og løvgræshopper, og tilbyd myrer jævnligt.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Phrynosoma asio* er rolig og bevæger sig i korte stræk. Den falder i ét med underlaget og ligger ofte halvt nedgravet.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Mexico.