herpy

LEGUANER

Texas horned lizard

Phrynosoma cornutum

Phrynosoma cornutum er en bred, fladtrykt øgle med horn på hovedet og to rækker spidse skæl langs siderne. Den lever på åbent, tørt græsland og i krat i det sydlige USA og det nordlige Mexico. Den bliver 7-13 cm fra snude til kloak, er dagaktiv og lever mest af myrer. Netop føden er den store hindring: den er svær at erstatte, og arten er en af de sværeste øgler at holde i terrarium.

Familie: Phrynosomatidae Tidligere navn: *Agama cornuta; Phrynosoma brevicornis; Phrynosoma bufonium; Phrynosoma harlanii; Phrynosoma planiceps*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**7-13 cm** snude-kloak-længde
Vægt	**25-90 g**
Levetid	**7-9 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Halvørken og savanne**
Sværhedsgrad	**Ekspert**

PASNING

Min. terrarie	**100 × 50 × 40 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**27-29 °C**
Hotspot	**38-42 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**20-40 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**24 mdr.**
Kuldstørrelse	**14-37 æg**
Kuld pr. år	**1**
Inkubation	**40-61 dage** ved 27-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Slægten *Phrynosoma* står på CITES liste II (siden 23.2.2023) og i EU's bilag B. Handel over EU's grænse kræver CITES-papirer, og dyrets lovlige oprindelse skal kunne dokumenteres, så få papirer med ved køb. CITES-tilladelser og -certifikater udstedes i Danmark af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Arten står ikke på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Der findes kun lidt viden om pasningen af *Phrynosoma cornutum*. Pasningen bygger derfor på levestedet: åbent, tørt terræn, løs jord, stærk sol og en føde af myrer.

TEMPERATUR

Arten er en solelsker og skal have en solplads, hvor overfladen når 38-42 °C, målt med et infrarødt termometer. Resten af terrariet skal være køligere, 27-29 °C om dagen, så øglen selv kan vælge, hvor længe den vil ligge i varmen.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden skal være lav, 20-40 %, og terrariet skal tørre helt op i løbet af dagen. Bunden må ikke være våd. Arten drikker næsten ikke af en skål, men slikker dug og regndråber af planter og af sin egen krop.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og tilbringer dagen i åbent sollys, så den har brug for kraftigt lys og UVB hele året. Brug et UVB-rør (Ferguson-zone 3, T5 HO 10-14 %) eller en kombineret UVB-metaldamplampe over solpladsen.

FODER

Føden er den afgørende begrænsning. I naturen er omkring 70 % af føden høstmyrer (*Pogonomyrmex*), og ungerne æder kun små myrer. Resten er termitter, biller og græshopper. Kosten kan ikke gentages fuldt ud i et terrarium.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Phrynosoma cornutum er rolig og stille og lever alene. Den gør ikke meget væsen af sig og er let at overse, fordi den falder i ét med underlaget. Den bevæger sig i korte stræk, hæver overkroppen og kigger sig omkring.

OPRINDELIG UDBREDELSE

USA og Mexico.