herpy

LEGUANER

Round-tailed Horned Lizard

Phrynosoma modestum

Phrynosoma modestum er et af de mindste hornfirben: en kort, rund, grå eller brun øgle på op til 7 cm fra snude til kloak, som lever på stenet, tørt terræn i det sydvestlige USA og det nordlige Mexico. Den lever mest af myrer, og netop føden gør arten ekstremt svær at holde i terrarium. Pasningen er næsten ikke dokumenteret.

Familie: Phrynosomatidae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**7 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**7-9 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Halvørken og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Ekspert**

PASNING

Min. terrarie	**80 × 40 × 35 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**27-29 °C**
Hotspot	**38-42 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**20-40 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**6-19 æg**
Kuld pr. år	**1-2**
Inkubation	**40-61 dage** ved 27-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Slægten *Phrynosoma* står på CITES liste II (siden 23.2.2023) og i EU's bilag B. Handel over EU's grænse kræver CITES-papirer, og dyrets lovlige oprindelse skal kunne dokumenteres, så få papirer med ved køb. CITES-tilladelser og -certifikater udstedes i Danmark af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Arten står ikke på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes meget lidt viden om pasningen af *Phrynosoma modestum*. Pasningen bygger derfor på levestedet (tørt, stenet terræn med stærk sol) og på den nærtstående og bedre kendte *Phrynosoma cornutum*.
TEMPERATUR	Arten er en solelsker og skal have en solplads, hvor overfladen når 38-42 °C, målt med et infrarødt termometer. Resten af terrariet skal være køligere, 27-29 °C om dagen, så dyret selv kan vælge, hvor længe det vil ligge i varmen.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være lav, 20-40 %, og terrariet skal tørre helt op i løbet af dagen. Bunden må ikke være våd. Tallet er lånt fra *Phrynosoma cornutum*. Arten drikker næsten ikke af en skål.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og tilbringer dagen i åbent sollys, så den har brug for kraftigt lys og UVB hele året. Brug et UVB-rør (Ferguson-zone 3, T5 HO 10-14 %) eller en kombineret UVB-metaldamplampe over solpladsen.
FODER	Føden er den afgørende begrænsning, og det er den, der gør arten til et dyr for eksperter. I naturen er myrer hovedføden, især høstmyrer og honningmyrer, suppleret med termitter, biller og larver.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Phrynosoma modestum* er stille og rolig og lever alene. Den gør ikke meget væsen af sig og er let at overse, fordi den falder i ét med underlaget. Den stresses let, og bliver den grebet, puster den sig op og stikker med hornene.
OPRINDELIG UDBREDELSE	USA og Mexico.