herpy

LEGUANER

Desert horned lizard

Phrynosoma platyrhinos

Phrynosoma platyrhinos er en bred, fladtrykt hornfirben fra ørkenerne i det vestlige USA og det nordvestlige Mexico. Den bliver 7-10 cm fra snude til kloak, er dagaktiv og graver sig ned i løst sand. Den lever mest af myrer, og netop føden gør den til en af de sværeste øgler at holde i terrarium. Der findes kun lidt viden om, hvordan den passes.

Familie: Phrynosomatidae Tidligere navn: *Anota calidiarum; Doliosaurus platyrhinos*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**7-10 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**7-9 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Ørken og halvørken**
Sværhedsgrad	**Ekspert**

PASNING

Min. terrarie	**100 × 50 × 40 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**27-30 °C**
Hotspot	**38-42 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**20-40 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**2-16 æg**
Kuld pr. år	**1-2**
Inkubation	**40-61 dage** ved 27-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Slægten *Phrynosoma* står på CITES liste II (siden 23.2.2023) og i EU's bilag B. Handel over EU's grænse kræver CITES-papirer, og dyrets lovlige oprindelse skal kunne dokumenteres, så få papirer med ved køb. CITES-tilladelser og -certifikater udstedes i Danmark af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Arten står ikke på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Der findes kun lidt viden om pasningen af *Phrynosoma platyrhinos*. Pasningen bygger derfor på levestedet: åbne, varme sandflader, løs bund, stærk sol og en føde af myrer.

TEMPERATUR

Arten er en solelsker og skal have en solplads, hvor overfladen når 38-42 °C, målt med et infrarødt termometer. Resten af terrariet skal være køligere, 27-30 °C om dagen, så øglen selv kan vælge, hvor længe den vil ligge i varmen.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden skal være lav, 20-40 %, og terrariet skal tørre helt op i løbet af dagen. Bunden må ikke være våd. Arten drikker næsten ikke af en skål, men slikker dråber af sten og planter.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og tilbringer dagen i åbent sollys, så den har brug for kraftigt lys og UVB hele året. Brug et UVB-rør (Ferguson-zone 3, T5 HO 10-14 %) eller en kombineret UVB-metaldamplampe over solpladsen.

FODER

Føden er den afgørende begrænsning. I naturen udgør myrer omkring halvdelen til fire femtedele af føden, og arten æder store mængder. Resten er biller, fårekyllinger, græshopper og fluer.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Phrynosoma platyrhinos er rolig og lever alene. Den gør ikke meget væsen af sig og er let at overse, fordi den falder i ét med underlaget. Den bevæger sig i korte stræk og stopper igen.

OPRINDELIG UDBREDELSE

USA og Mexico.