herpy

LEGUANER

Regal horned lizard

Phrynosoma solare

Phrynosoma solare er et stort, fladt hornfirben fra ørkenerne i det sydlige Arizona, New Mexico og det nordvestlige Mexico. Hunnen bliver op til 12 cm fra snude til kloak og har en krans af fire store horn bagpå hovedet. Arten er dagaktiv og lever næsten kun af myrer, og netop føden gør den til en af de sværeste øgler at holde i terrarium.

Familie: Phrynosomatidae Tidligere navn: *Phrynosoma regale; Phrynosoma solaris*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**10-12 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**7-9 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Ørken og halvørken**
Sværhedsgrad	**Ekspert**

PASNING

Min. terrarie	**100 × 50 × 40 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**27-30 °C**
Hotspot	**38-42 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**20-40 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**7-33 æg**
Kuld pr. år	**1**
Inkubation	**40-61 dage** ved 27-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Slægten *Phrynosoma* står på CITES liste II (siden 23.2.2023) og i EU's bilag B. Handel over EU's grænse kræver CITES-papirer, og dyrets lovlige oprindelse skal kunne dokumenteres, så få papirer med ved køb. CITES-tilladelser og -certifikater udstedes i Danmark af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Arten står ikke på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der findes kun lidt viden om pasningen af *Phrynosoma solare*. Pasningen bygger derfor på levestedet: åbent, tørt terræn med løs jord, stærk sol og en føde af myrer.

TEMPERATUR
Arten er en solelsker og skal have en solplads, hvor overfladen når 38-42 °C, målt med et infrarødt termometer. Resten af terrariet skal være køligere, 27-30 °C om dagen, så øglen selv kan vælge, hvor længe den vil ligge i varmen.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal være lav, 20-40 %, og terrariet skal tørre helt op i løbet af dagen. Bunden må ikke være våd. Arten drikker næsten ikke af en skål, men slikker dråber af sten og planter.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og tilbringer dagen i åbent sollys, så den har brug for kraftigt lys og UVB hele året. Brug et UVB-rør (Ferguson-zone 3, T5 HO 10-14 %) eller en kombineret UVB-metaldamplampe over solpladsen.

FODER
Føden er den afgørende begrænsning. I naturen er omkring 89 % af føden myrer, især høstmyrer, og arten æder store mængder. Resten er biller, andre insekter og edderkopper.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Phrynosoma solare er rolig og lever alene. Den gør ikke meget væsen af sig og er let at overse, fordi den falder i ét med underlaget. Den er langsom og bevæger sig i korte stræk. Hannerne signalerer med nik og armstrækninger.

OPRINDELIG UDBREDELSE
USA og Mexico.