herpy

LEGUANER

Common Chuckwalla

Sauromalus ater

Sauromalus ater er en bredbygget, fladtrykt ørkenleguan fra det sydvestlige USA og det nordvestlige Mexico. Den bliver 35-50 cm lang, er dagaktiv og lever næsten kun af planter. Den kræver et tørt terrarie med en meget varm solplads, kraftig UVB og stabile klippeopbygninger med sprækker, den kan kile sig ind i.

Familie: Iguanidae Tidligere navn: *Euphryne obesus; Sauromalus australis; Sauromalus interbrachialis; Sauromalus obesus; Sauromalus shawi; Sauromalus townsendi* Udgivet 17. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**35-50 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-20 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Klippeboende og jordboende**
Biotop	**Ørken og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**26-35 °C**
Hotspot	**43-50 °C**
Temperatur, nat	**16-24 °C**
Luftfugtighed	**20-35 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 4
Kost	**Planter**
Holdes	**Enkeltvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**24-84 mdr.**
Kuldstørrelse	**5-16 æg**
Kuld pr. år	**1**
Inkubation	**85-95 dage** ved 27-28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står hverken på CITES-listerne eller i EU's bilag A-D. Ingen leguaner eller andre arter i gruppen står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 120 × 60 × 60 cm (længde × bredde × højde). Gulvarealet betyder mest, og højden er mindre vigtig. Til hver ekstra hun lægges omkring 0,2 m² gulvplads.

TEMPERATUR

Luften skal ligge på 26-35 °C om dagen med en tydelig gradient. Solpladsen skal have 43-50 °C målt på overfladen med et infrarødt termometer; angivelserne går helt op til 54 °C, men dyret skal altid kunne trække sig fra varmen.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luften i udbredelsesområdet er meget tør, og terrariet skal holdes tørt: 20-35 % er passende. Arten tåler dog almindelig stueluft, så det er ikke nødvendigt at styre luftfugtigheden. Terrariet skal ikke sprøjtes.

VAND OG VANDKVALITET

Dyret skal have en lav, stabil vandskål, der ikke kan vælte, med frisk vand hver dag. Det meste af væsken kommer fra foderet, men dyret drikker af og til, og skålen skal stå fremme hele tiden. Rens den, når den er fyldt med sand.

LYS OG UVB

Sauromalus ater er dagaktiv og soler sig kraftigt. Den hører til Ferguson-zone 4, og UVB er nødvendigt.

FODER

Sauromalus ater er planteæder. Grundkosten er mørkegrønne blade hver dag: mælkebøtteblade, julesalat, cikorie, rucola, sennepskål og kålroeblade. Romainesalat og andre bladgrøntsager kan gives som supplement.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Sauromalus ater er rolig og kan blive tæt på tam, hvis den håndteres roligt og regelmæssigt fra ung. Den kan reagere voldsomt i det øjeblik, man griber den, så tag fat roligt.

OPRINDELIG UDBREDELSE

USA og Mexico.