herpy

LEGUANER

Blue Spiny Lizard

Sceloporus cyanogenys

Sceloporus cyanogenys er en kraftig, ruskællet øgle fra klippeland i det sydlige Texas og det østlige Mexico. Hannen har blå strube, blå sider og en sort halskrave. Arten er dagaktiv, lever af insekter og kræver et rummeligt, tørt terrarie med sten, UVB og en varm solplads. Den føder levende unger og er sky og hurtig.

Familie: Phrynosomatidae Udgivet 17. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**25-36 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-7 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Klippeboende og jordboende**
Biotop	**Halvørken og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**100 × 50 × 50 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**27-31 °C**
Hotspot	**38-42 °C**
Temperatur, nat	**21-26 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kønsmoden	**28-36 mdr.**
Kuldstørrelse	**5-20 unger**
Kuld pr. år	**1**
Drægtighed	**90-120 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke vurderet (NE)**

Arten står hverken på CITES-listerne eller i EU's bilag A-D. Ingen leguaner eller andre arter i gruppen står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 100 × 50 × 50 cm (længde × bredde × højde). Større er bedre, for arten er hurtig og aktiv og bruger hele gulvarealet; i naturen er territoriet mindst lige så stort som et soveværelse.
TEMPERATUR	Terrariet skal have en tydelig gradient. Luften skal være 27-31 °C om dagen, og solpladsen skal have 38-42 °C på overfladen, målt med et infrarødt termometer.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luften skal være tør til moderat fugtig: 30-50 %. Arten trives dårligt i fugtig, stillestående luft, så ventilationen skal være god. Stil en lav, stabil skål med frisk vand, og skift vandet dagligt.
LYS OG UVB	*Sceloporus cyanogenys* er dagaktiv og soler sig i fuld sol, så den skal have kraftigt lys og UVB. Brug et T5 HO-rør (Ferguson-zone 3) i en reflektor over solpladsen, og hold afstanden inden for producentens anbefaling.
FODER	*Sceloporus cyanogenys* æder insekter. Giv en varieret kost af levende insekter: fårekyllinger, små kakerlakker, melorme, zophobaslarver, silkeorme og voksmøllarver (de sidste sparsomt).
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Dyret er hurtigt og sky og forsvarer sig ved at bide og flygte. Det er et dyr at kigge på, ikke at håndtere. Skal det tages op, så hold om kroppen fra hals til kloak.
OPRINDELIG UDBREDELSE	USA, Mexico og Guatemala.