herpy

LEGUANER

Desert Spiny Lizard

Sceloporus magister

Sceloporus magister er en robust, tornet øgle fra ørkenerne i det sydvestlige USA og det nordvestlige Mexico. Den er dagaktiv, klatrer i træer, buske og på klipper og lever af insekter. Hannen har blå pletter på hals og bug. Den kræver et stort, tørt terrarie med kraftig UVB, en meget varm solplads og en kølig vinterhvile. Hunnen lægger æg.

Familie: Phrynosomatidae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**20-30 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-8 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende, klippeboende og jordboende**
Biotop	**Ørken og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 50 × 50 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**27-32 °C**
Hotspot	**38-42 °C**
Temperatur, nat	**16-22 °C**
Luftfugtighed	**20-40 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Vinterhvile	**9-12 °C** 8-12 uger
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**12-24 mdr.**
Kuldstørrelse	**4-24 æg**
Kuld pr. år	**1-2**
Inkubation	**60-80 dage** ved 27-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står hverken på CITES-listerne eller i EU's bilag A-D. Ingen leguaner eller andre arter i gruppen står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt specifik viden om pasningen af *Sceloporus magister*, og den bygger på ørkenklimaet og på viden om slægten.
TEMPERATUR	Luften skal være 27-32 °C om dagen. Solpladsen skal have 38-42 °C på overfladen, målt med et infrarødt termometer. Arten foretrækker en kropstemperatur omkring 33 °C, og solpladsen skal være varm nok til, at den hurtigt kan nå den.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være lav, omkring 20-40 %. Terrariet skal være tørt og godt ventileret. Stil en lav skål med frisk vand, og skift vandet dagligt. Forstøv en gang imellem terrariets side let, så dyret kan slikke dråber.
LYS OG UVB	*Sceloporus magister* er dagaktiv og soler sig, så den skal have kraftig UVB. Brug et T5 HO-rør (Ferguson-zone 3) i en reflektor over solpladsen.
FODER	Arten er insektæder. Giv varierede levende insekter: fårekyllinger, kakerlakker, græshopper, melorme, zophobas, silkeorme og voksorm. Foderdyrene må ikke være større end dyrets hoved.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Dyret er opmærksomt, hurtigt og territorialt, og håndtering stresser det. Hold håndtering på et minimum, og tag aldrig fat i halen, for den kan knække af.
OPRINDELIG UDBREDELSE	USA og Mexico.