herpy

LEGUANER

Emerald Swift

Sceloporus malachiticus

Sceloporus malachiticus er en lille, kvik øgle fra de kølige bjergskove i Mellemamerika. Hannen er smaragdgrøn med blå bugpletter, hunnen brun med mørke pletter. Arten er dagaktiv, lever af insekter og klatrer såvel som løber på jorden. Den kræver et godt belyst terrarie med UVB, en varm solplads, fugtig luft og køligere nætter. Den føder levende unger og er svær at få til at falde til.

Familie: Phrynosomatidae Udgivet 17. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**15-25 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**3-5 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende, klippeboende og jordboende**
Biotop	**Bjergskov og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**90 × 45 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Hotspot	**33-37 °C**
Temperatur, nat	**16-20 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kønsmoden	**12-18 mdr.**
Kuldstørrelse	**2-10 unger**
Drægtighed	**90-120 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står hverken på CITES-listerne eller i EU's bilag A-D. Ingen leguaner eller andre arter i gruppen står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der findes kun lidt viden om pasningen af *Sceloporus malachiticus*, og den bygger i høj grad på klimaet i bjergskovene. Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 90 × 45 × 60 cm (længde × bredde × højde).

TEMPERATUR
Sceloporus malachiticus kommer fra køligere højder og skal ikke have de høje temperaturer, som ørkenarterne i slægten får. Luften skal være 24-29 °C om dagen.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal være 60-80 %. Sprøjt planter og indretning morgen og aften, så der er dråber at drikke, og hold bunden fugtig, men ikke våd.

LYS OG UVB
Sceloporus malachiticus er dagaktiv og soler sig midt på dagen, så den skal have UVB. Brug et T5 HO-rør (Ferguson-zone 3) i en reflektor over solpladsen.

FODER
Arten er insektæder, men æder også lidt blade. Giv levende insekter: fårekyllinger, kakerlakker, små græshopper, melorme, silkeorme og soldaterfluelarver, ikke større end dyrets hoved.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Dyret er sky og kvikt og tåler håndtering dårligt, så håndtering holdes på et minimum. Tag aldrig fat i halen, for den kan knække af. Hanner er territoriale og må ikke bo sammen.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica og Panama.