herpy

LEGUANER

Western fence lizard

Sceloporus occidentalis

Sceloporus occidentalis er en lille, hurtig og ruskællet øgle fra det vestlige USA, der sidder på sten, stammer og hegn i fuld sol. Hannen har blå pletter på bugen og struben, som han viser frem med armbøjninger. Arten bliver omkring 21 cm, er dagaktiv og lever af insekter. Den kræver en kraftig solplads, UVB, et rummeligt terrarie og et tætsluttende låg.

Familie: Phrynosomatidae Tidligere navn: *Sceloporus longipes; Sceloporus smaragdinus*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**14-23 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**4-5 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende, klippeboende og jordboende**
Biotop	**Klippeterræn og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**80 × 40 × 40 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**27-28 °C**
Hotspot	**38-42 °C**
Temperatur, nat	**18-24 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Vinterhvile	**8-12 °C** 8-12 uger
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**12-24 mdr.**
Kuldstørrelse	**3-17 æg**
Kuld pr. år	**1-3**
Inkubation	**55-65 dage** ved 27-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står hverken på CITES-listerne eller i EU's bilag A-D. Ingen leguaner eller andre arter i gruppen står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af netop *Sceloporus occidentalis*, så pasningen bygger på de krav, som de små, solelskende arter i slægten deler.
TEMPERATUR	Om dagen skal temperaturen være 27-28 °C. Direkte under en varmelampe skal der være en solplads på 38-42 °C, målt på overfladen med et infrarødt termometer.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være moderat, omkring 30-50 %. Arten lever i åbne, solbeskinnede områder og tåler ikke vedvarende dampende fugt, men bunden må heller ikke være støvtør. Tallet er et skøn ud fra levestedet.
LYS OG UVB	*Sceloporus occidentalis* er dagaktiv og solelskende og har brug for stærkt lys og UVB hele året. Brug et UVB-rør (Ferguson-zone 3) eller en kombineret UVB-metaldamplampe over solpladsen.
FODER	*Sceloporus occidentalis* er insektæder. I naturen spiser den fårekyllinger, edderkopper, flåter, skorpioner, myrer og biller og tager nu og da en mindre øgle.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Sceloporus occidentalis* er vagtsom, hurtig og territorial. Hannerne viser sig frem med armbøjninger, hovedniktninger og opblæst krop. Arten bliver ikke tam og egner sig ikke til håndtering.
OPRINDELIG UDBREDELSE	USA og Mexico.