herpy

LEGUANER

Rose-bellied Lizard

Sceloporus variabilis

Sceloporus variabilis er en lille, ruskællet øgle fra Mexico og Mellemamerika. Hannen har en lyserød bugplet med mørkeblå kant på hver side, hunnen er brunlig og afdæmpet. Arten er dagaktiv, lever af insekter og lægger æg flere gange om året. Den kræver et varmt terrarie med sol, UVB og mange skjul, og den er hurtig og sky.

Familie: Phrynosomatidae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**10-15 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**4-5 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Savanne, tørskov og regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**80 × 40 × 40 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**27-30 °C**
Hotspot	**38-42 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**2-7 æg**
Kuld pr. år	**3-4**
Inkubation	**55-70 dage** ved 27-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står hverken på CITES-listerne eller i EU's bilag A-D. Ingen leguaner eller andre arter i gruppen står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Sceloporus variabilis*.
TEMPERATUR	Om dagen skal baggrundstemperaturen være 27-30 °C. Direkte under en varmelampe skal der være en solplads på 38-42 °C, målt på overfladen med et infrarødt termometer.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være moderat, omkring 40-60 %. Arten lever både i tørre og fugtige egne, men altid på solbeskinnede pletter, og terrariet må ikke være vedvarende dampende. Bunden må heller ikke være støvtør.
LYS OG UVB	*Sceloporus variabilis* er dagaktiv og soler sig i fuld sol, så den skal have kraftigt lys og UVB hele året. Brug et UVB-rør til solelskende arter (Ferguson-zone 3) eller en kombineret UVB-metaldamplampe over solpladsen.
FODER	*Sceloporus variabilis* æder insekter. Giv en varieret kost af levende insekter som små fårekyllinger, små kakerlakker, græshopper, silkeorme og melorme. Giv mindst tre-fire slags, og lad ikke melorme udgøre hovedparten.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Sceloporus variabilis* er hurtig, vagtsom og territorial. Hannerne viser sig frem med armbøjninger og hovednik og forsvarer deres plads mod andre hanner. Arten bliver ikke tam og egner sig ikke til håndtering.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Mexico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua og Costa Rica.