herpy

ORMEØGLER

Campbell's Alligator Lizard

Abronia campbelli

Abronia campbelli er en lille, træboende ormeøgle, der kun findes i egeskovene i det sydøstlige Guatemala. Den bliver omkring 20-30 cm, føder levende unger og lever af insekter. Arten er kritisk truet i naturen, og der findes næsten ingen viden om pasningen; den kræver et højt, luftigt terrarie med kølige nætter.

Familie: Anguidae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**20-30 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**14-45 g**
Levetid	**10-20 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Bjergskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**50 × 50 × 75 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**20-27 °C**
Hotspot	**26-30 °C**
Temperatur, nat	**10-18 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kønsmoden	**24-36 mdr.**
Kuldstørrelse	**3-15 unger**
Kuld pr. år	**1**
Drægtighed	**180-240 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks I**
EU-bilag	**Bilag A**
IUCN	**Kritisk truet (CR)**

Arten står på CITES liste I og i EU's bilag A (forordning 338/97), som en af fem arter i slægten *Abronia*. Køb, salg, udbud til salg og kommerciel udstilling kræver derfor som udgangspunkt et EU-certifikat for det enkelte dyr (forordning 338/97, art. 8 og 10). Certifikater og CITES-dokumenter udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) efter BEK nr. 1588 af 9.12.2024. Spørg styrelsen, før du køber, sælger eller udstiller, og sørg for, at certifikatet følger dyret. Arten er ikke blandt de dyr, som private ikke må holde i Danmark (BEK nr. 1261 af 17.11.2015).

Pasning i korte træk

TERRARIET

Pasningen af *Abronia campbelli* er ikke beskrevet, og tallene her er lånt fra den nært beslægtede *Abronia graminea*, som er den bedst kendte art i slægten, og fra slægten i almindelighed.

TEMPERATUR

Abronia campbelli tåler ikke varme. Dagtemperaturen skal ligge på 20-27 °C, og solpladsen under en svag spot må være 26-30 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Den relative luftfugtighed skal ligge på 60-80 %, med de højeste værdier om natten og efter forstøvning. Forstøv planter, vægge og dyret let næsten hver dag, gerne med en trykforstøver eller et tågeanlæg, der giver en fin tåge.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og har brug for UVB. Det bedste er naturligt, ufiltreret sollys, fx i en netkasse udendørs i tørvejr om sommeren med skygge og køligt underlag, så dyret kan flytte sig.

FODER

Abronia campbelli lever af insekter og andre smådyr. Giv fårekyllinger, græshopper, melorme, kakerlakker, snegle, edderkopper og bløde larver. Foderdyr fodres i et døgn før brug med grønt og grøntsager.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Arten er stille og sky. Dyret bruger det meste af dagen på at sidde stille på en gren eller i en bromelie og soler sig i korte perioder. Det er ikke et dyr, der skal håndteres.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Guatemala.