herpy

ORMEØGLER

Fringed Arboreal Alligator Lizard

Abronia fimbriata

Abronia fimbriata er en brun, træboende ormeøgle med tornlignende skæl over øret fra tågeskovene i Guatemalas nordøstlige højland. Den bliver omkring 25-35 cm, føder levende unger og spiser insekter. Den kræver et højt, luftigt terrarie med mos og bromelier og kølige temperaturer. Arten er truet, og pasningen er sparsomt beskrevet.

Familie: Anguidae Tidligere navn: *Barissia fimbriata; Gerrhonotus fimbriatus* Udgivet 17. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**25-35 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-20 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Bjergskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**50 × 50 × 75 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-27 °C**
Hotspot	**26-30 °C**
Temperatur, nat	**10-18 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kønsmoden	**24-36 mdr.**
Kuldstørrelse	**4 unger**
Kuld pr. år	**1**
Drægtighed	**180-240 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks I**
EU-bilag	**Bilag A**
IUCN	**Truet (EN)**

Arten står på CITES liste I og i EU's bilag A (forordning 338/97), som en af fem arter i slægten *Abronia*. Køb, salg, udbud til salg og kommerciel udstilling kræver derfor som udgangspunkt et EU-certifikat for det enkelte dyr (forordning 338/97, art. 8 og 10). Certifikater og CITES-dokumenter udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) efter BEK nr. 1588 af 9.12.2024. Spørg styrelsen, før du køber, sælger eller udstiller, og sørg for, at certifikatet følger dyret. Arten er ikke blandt de dyr, som private ikke må holde i Danmark (BEK nr. 1261 af 17.11.2015).

Pasning i korte træk

TERRARIET	Pasningen af *Abronia fimbriata* er kun sparsomt beskrevet, og tallene her er lånt fra den nært beslægtede *Abronia graminea*, som er den bedst kendte art i slægten.
TEMPERATUR	*Abronia fimbriata* tåler ikke varme. Dagtemperaturen skal ligge på 20-27 °C, og solpladsen under en svag spot må være 26-30 °C. Dyret er mest aktivt ved 24-27 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Den relative luftfugtighed skal ligge på 60-80 %, med de højeste værdier om natten og efter sprøjtning. Sprøjt planter, vægge og dyrene let næsten hver dag, gerne med en tryksprøjte eller et tågeanlæg, der giver en fin tåge.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og har brug for UVB. Det bedste er naturligt, ufiltreret sollys, fx i en netkasse udendørs i tørvejr om sommeren med skygge og køligt underlag, så dyret kan flytte sig.
FODER	*Abronia fimbriata* lever af insekter og andre smådyr. Giv fårekyllinger, græshopper, melorme, kakerlakker, snegle, edderkopper og bløde larver, fx grønne sommerfuglelarver og fluelarver med højt kalkindhold.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er stille og sky. Dyret bruger det meste af dagen på at sidde stille på en gren eller i en bromelie og soler sig i korte perioder. Det er ikke et dyr, der skal håndteres.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Guatemala.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/ormeoegler/abronia-fimbriata