herpy

ORMEØGLER

Terrestrial Alligator Lizard

Abronia graminea

Abronia graminea er en lille, smaragdgrøn og træboende ormeøgle fra tågeskovene i det sydlige Mexico. Den bliver 20-30 cm, føder levende unger og spiser insekter. Den kræver et højt, luftigt terrarie med mos og bromelier, køligere temperaturer end de fleste terrariedyr og daglig sprøjtning, uden at luften står stille. Arten er truet i naturen og passer bedst til erfarne holdere.

Familie: Anguidae Tidligere navn: *Gerrhonotus gramineus; Abronia taeniata graminea* Udgivet 17. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**20-30 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**15-25 g**
Levetid	**10-20 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Bjergskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**50 × 50 × 75 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-27 °C**
Hotspot	**26-30 °C**
Temperatur, nat	**10-18 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kønsmoden	**24-36 mdr.**
Kuldstørrelse	**2-12 unger**
Kuld pr. år	**1**
Drægtighed	**180-240 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Truet (EN)**

Arten står på CITES liste II og i EU's bilag B (forordning 338/97), som alle arter i slægten *Abronia* undtagen fem arter på liste I/bilag A. Handel over grænser kræver CITES- og EU-dokumenter, som i Danmark udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) efter BEK nr. 1588 af 9.12.2024. Arten er ikke blandt de dyr, som private ikke må holde i Danmark (BEK nr. 1261 af 17.11.2015). Spørg sælger om dokumentation for dyrets lovlige oprindelse.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et par skal have et terrarie på mindst 50 × 50 × 75 cm (længde × bredde × højde). Højden er vigtigere end gulvarealet, men større er bedre, og 60 × 60 × 90 cm giver tydeligt bedre plads.

TEMPERATUR
Abronia graminea tåler ikke varme. Dagtemperaturen skal ligge på 20-27 °C, og solpladsen under en svag spot må være 26-30 °C. Dyret er mest aktivt ved 24-27 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Den relative luftfugtighed skal ligge på 60-80 %, med de højeste værdier om natten og efter sprøjtning. Sprøjt planter, vægge og dyrene let næsten hver dag, gerne med en tryksprøjte eller et tågeanlæg, der giver en fin tåge.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og har brug for UVB. Det bedste er naturligt, ufiltreret sollys, fx i en netkasse udendørs i tørvejr om sommeren med skygge og køligt underlag, så dyret kan flytte sig.

FODER
Abronia graminea lever af insekter og andre smådyr. Giv fårekyllinger, græshopper, melorme, kakerlakker, snegle, edderkopper og bløde larver, fx grønne sommerfuglelarver og fluelarver med højt kalkindhold.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Arten er stille og sky. Dyret bruger det meste af dagen på at sidde stille på en gren eller i en bromelie og soler sig i korte perioder. Det er ikke et dyr, der skal håndteres.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Mexico.