herpy

ORMEØGLER

Iberian Worm Lizard

Blanus cinereus

Blanus cinereus er en benløs ormeøgle fra Den Iberiske Halvø, der lever hele livet under jorden i løs, humusrig jord og under sten. Dyret er 15-25 cm fra snude til kloak og har ringdelt krop, rundet snude og næsten blinde øjne. Arten lægger 1-2 æg om året og kræver en dyb, let fugtig bund, jævn varme nedefra og ro. Der findes kun lidt viden om pasningen.

Familie: Blanidae Tidligere navn: *Amphisbaena cinerea; Blanus mariae* Udgivet 17. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**15-25 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Gravende**
Biotop	**Tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Ekspert**

PASNING

Min. terrarie	**40 × 30 × 30 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Temperatur, nat	**15-20 °C**
Luftfugtighed	**50-70 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Ikke nødvendig**
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-3 æg**
Kuld pr. år	**1**
Inkubation	**60-90 dage** ved 22-26 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står hverken på CITES-listerne eller i EU's forordning 338/97, så der kræves ingen CITES-papirer. Arten er ikke blandt de dyr, som private ikke må holde i Danmark (BEK nr. 1261 af 17.11.2015). Spørg sælger om dyrets oprindelse.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Blanus cinereus*. Arten lever hele livet under jorden og ses næsten aldrig, så anbefalingerne bygger på levestedet og på korttidshold af arten og af *Trogonophis wiegmanni* til forskning.
TEMPERATUR	Dyrene varmer sig ved at ligge nedgravet i opvarmet jord, ikke i lysets varme.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Det er bundens fugt, der tæller, ikke luftens. Bunden skal være svagt til moderat fugtig, ikke våd: den skal kunne holde en form, når den presses i hånden, uden at klistre eller dryppe. Sprøjt bunden let med vand hver dag.
LYS OG UVB	Dyrene ligger nedgravet og ses ikke i lyset. UVB er ikke nødvendigt.
FODER	*Blanus cinereus* spiser insekter og insektlarver. Melormepupper og -larver og små, nydræbte fårekyllinger, støvet med et multivitaminpulver, er velegnet foder. Læg føde under flisen tre gange om ugen.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Blanus cinereus* ses sjældent. Dyrene ligger nedgravet og kommer kun frem under flisen. Det er normalt. Grav ikke efter dyrene for at tjekke dem: stress får dem til at bevæge sig mindre og bruge et mindre område.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Spanien, Portugal og Gibraltar.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/ormeoegler/blanus-cinereus