herpy

ORMEØGLER

Northern Alligator Lizard

Elgaria coerulea

Elgaria coerulea er en slank, langhalet ormeøgle fra Nordamerikas vestkyst og Rocky Mountains, fra det sydlige British Columbia til Sierra Nevada i Californien. Den bliver 20-30 cm, er dagaktiv og er tilpasset kølige, fugtige omgivelser. Den føder levende unger og skal have et køligt terrarie med mange skjul og en kølig vinterhvile.

Familie: Anguidae Tidligere navn: *Gerrhonotus coeruleus*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**20-30 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**80 × 40 × 50 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**15-24 °C**
Hotspot	**28-30 °C**
Temperatur, nat	**8-14 °C**
Luftfugtighed	**50-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Vinterhvile	**4-8 °C** 8-12 uger
Kost	**Insekter, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kuldstørrelse	**4-15 unger**
Drægtighed	**60-120 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke omfattet af CITES eller EU's forordning 338/97, så der kræves ingen CITES-papirer. Den står ikke på listen over dyr, som private ikke må holde (BEK nr. 1261 af 17.11.2015). Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET	*Elgaria coerulea* er en hårdfør øgle, der holder sig godt i fangenskab, når temperaturen er lav nok.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen er 15-24 °C med en solplads på 28-30 °C målt på overfladen. Arten tåler varme dårligere end kulde, så luften i terrariet må ikke komme over 28 °C i længere tid, og solpladsen er kun tændt nogle timer om dagen.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal ligge på 50-80 %, højest nær den fugtige ende og om natten. Arten lever i kølige, fugtige skove og ved vandløb og trives ikke i tør luft.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og soler sig kort i solåbne pletter, så terrariet skal have en solplads og svag UVB. Et UVB-rør af svag styrke svarende til Ferguson-zone 1 over den ene halvdel passer til levevisen.
FODER	*Elgaria coerulea* æder en lang række smådyr: fårekyllinger, biller, edderkopper, møl, snegle og orme. Større dyr tager også små øgler og i sjældne tilfælde nyfødte mus.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er hemmelighedsfuld og gemmer sig under dækning, men er også fremme i det åbne om morgenen og aftenen. Den er ikke et dyr til håndtering. Bliver den grebet, bider den hårdt og tømmer tarmen, og halen tabes let.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Canada og USA.