herpy

ORMEØGLER

Madrean Alligator Lizard

Elgaria kingii

Elgaria kingii er en kraftig, langhalet ormeøgle fra det sydvestlige USA og det nordvestlige og vestlige Mexico. Den lever i ørken, græsland, krat og skov op i omkring 2.700 m højde og er aktiv om dagen og i skumringen. Den lægger æg og skal have et køligt, tørt til let fugtigt terrarie med mange skjul og en kølig vinterhvile. Pasningen bygger på de nære slægtninge.

Familie: Anguidae Tidligere navn: *Gerrhonotus kingii*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**14 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**15 år**
Aktiv	**Dag og skumring**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Halvørken og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**100 × 50 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**18-28 °C**
Hotspot	**30-33 °C**
Temperatur, nat	**12-16 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Vinterhvile	**6-10 °C** 8-12 uger
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**18 mdr.**
Kuldstørrelse	**5-15 æg**
Inkubation	**50-55 dage** ved 24-28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke omfattet af CITES eller EU's forordning 338/97, så der kræves ingen CITES-papirer. Den står ikke på listen over dyr, som private ikke må holde (BEK nr. 1261 af 17.11.2015). Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der findes kun lidt viden om pasningen af *Elgaria kingii*. Pasningen nedenfor bygger på klimaet i udbredelsesområdet, levestedet og størrelsen.

TEMPERATUR
Dagtemperaturen i terrariet er 18-28 °C med en solplads på 30-33 °C målt på overfladen. En tydelig forskel mellem den varme og den kølige ende er vigtigere end høj varme. Om natten falder temperaturen til 12-16 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal ligge på 40-60 %, højest i den fugtige zone og om natten. Terrariet skal have både en tør og en let fugtig side, så dyret kan vælge. Sæt en lav, stabil vandskål i terrariet og skift vandet dagligt.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv, så terrariet skal have en solplads og UVB. Et UVB-rør af svag til moderat styrke svarende til Ferguson-zone 2 over den ene halvdel passer til levevisen. Dyret skal kunne trække sig ud af lyset i skygge.

FODER
Arten æder især insekter som græshopper, sommerfuglelarver og møl og tager også skorpioner. Bevægelse udløser fangsten. I terrariet fodres med fårekyllinger, græshopper, kakerlakker, melorme og snegle.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Arten gemmer sig under dækning, men er også fremme i det åbne om morgenen og aftenen. Den er ikke et dyr til håndtering. Bliver den grebet, bider den hårdt og tømmer tarmen, og halen tabes let. Et bid skal vaskes og desinficeres.

OPRINDELIG UDBREDELSE
USA og Mexico.