herpy

ORMEØGLER

Southern Alligator Lizard

Elgaria multicarinata

Elgaria multicarinata er en kraftig, langhalet øgle fra Nordamerikas stillehavskyst, fra Washington til det nordlige Baja California. Den bliver 20-40 cm, er aktiv om dagen og i skumringen, også ved lave temperaturer, og æder alt, den kan overmande. Den skal have et køligt terrarie med mange skjul og en kølig vinterperiode og er et dyr at se på, ikke at håndtere.

Familie: Anguidae Tidligere navn: *Gerrhonotus multicarinatus* Udgivet 17. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**20-40 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag og skumring**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Halvørken og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**100 × 50 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**18-30 °C**
Hotspot	**30-35 °C**
Temperatur, nat	**12-16 °C**
Luftfugtighed	**40-70 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Vinterhvile	**6-10 °C** 8-12 uger
Kost	**Insekter, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**18 mdr.**
Kuldstørrelse	**5-20 æg**
Kuld pr. år	**1-3**
Inkubation	**50-55 dage** ved 24-28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke omfattet af CITES eller EU's forordning 338/97, så der kræves ingen CITES-papirer. Den står ikke på listen over dyr, som private ikke må holde (BEK nr. 1261 af 17.11.2015). Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der findes kun lidt viden om pasningen af *Elgaria multicarinata*. Pasningen nedenfor bygger på klimaet i udbredelsesområdet, levestedet og størrelsen.

TEMPERATUR
Dagtemperaturen i terrariet er 18-30 °C med en solplads på 30-35 °C målt på overfladen. Tallene er et skøn ud fra klimaet i udbredelsesområdet og artens lave kropstemperatur.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal ligge på 40-70 %, højest i den fugtige zone og om natten. Arten lever med tørre somre, men finder altid fugtige steder under sten og træ, og i tørre egne ses den næsten kun nær vand.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og soler sig, så terrariet skal have en solplads og UVB. Et UVB-rør af svag til moderat styrke svarende til Ferguson-zone 2 over den ene halvdel passer til levevisen; zonen er et skøn.

FODER
Elgaria multicarinata er et alsidigt rovdyr, der æder alt, den kan overmande: insekter og andre leddyr, snegle, små øgler og små pattedyr og en gang imellem fugleæg og fugleunger. Bevægelse udløser fangsten.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Arten er hemmelighedsfuld og gemmer sig under dækning, men er også fremme i det åbne om morgenen og aftenen. Den er ikke et dyr til håndtering. Bliver den grebet, bider den hårdt og tømmer tarmen, og halen tabes let.

OPRINDELIG UDBREDELSE
USA og Mexico.