herpy

ORMEØGLER

Wiegmann's Alligator Lizard

Gerrhonotus liocephalus

Gerrhonotus liocephalus er en kraftig, brunlig ormeøgle med lyse tværbånd fra skov og krat i det sydlige Mexicos højland. Den bliver 30-50 cm, er dagaktiv, klatrer godt og lægger æg. Der findes kun lidt viden om pasningen af netop denne art, og det meste bygger på den nære slægtning *Gerrhonotus infernalis* fra Texas og det nordøstlige Mexico.

Familie: Anguidae Udgivet 17. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**30-50 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Bjergskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**90 × 60 × 60 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Hotspot	**35-40 °C**
Temperatur, nat	**15-21 °C**
Luftfugtighed	**40-70 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**18-36 mdr.**
Kuldstørrelse	**5-31 æg**
Kuld pr. år	**1**
Inkubation	**50-70 dage** ved 24-26 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES eller i EU's bilag, så der kræves ingen CITES-papirer. Den er ikke blandt de dyr, som private ikke må holde i Danmark (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og den er ikke på EU's liste over invasive arter. Dyrevelfærdslovens almindelige krav gælder.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Gerrhonotus liocephalus*.
TEMPERATUR	Luften i terrariet skal ligge på 24-29 °C om dagen, med en solplads på 35-40 °C under halogenspots, hvor dyret kan varme sig. Om natten skal det være køligere, omkring 15-21 °C. Mål med digitale termometre.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være moderat, omkring 40-70 %, med højere fugt i skjulene. Tallet er et skøn ud fra klimaet. Sprøjt terrariet tre til fire gange om ugen om sommeren, så regntiden efterlignes, og sjældnere i den tørre tid.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og har brug for kraftigt lys og UVB. Brug et T5 HO-rør til UVB, så UV-indekset går fra 0 til 3 gennem terrariet, svarende til Ferguson-zone 2, og så dyret kan søge ud af UV-lyset.
FODER	*Gerrhonotus liocephalus* lever af insekter og andre smådyr og jager aktivt. Giv en varieret kost af fårekyllinger, kakerlakker, græshopper, knælere, vandrende pinde, bænkebidere, snegle, edderkopper, fluelarver, biller og larver.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er sky, men nysgerrig og kan blive meget rolig. Den soler sig på grene og sten og jager ved at snige sig ind på byttet, bøje forkroppen i en S-form og slå til. Lige før angrebet rykker den af og til med halen som en kat.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Mexico.