herpy

ORMEØGLER

Mexican Beaded Lizard

Heloderma horridum

Heloderma horridum er en stor, sort og gulplettet giftøgle fra de tropiske tørskove på Mexicos stillehavsside, større end *Heloderma suspectum*. Et bid er en akut medicinsk nødsituation. Arten bliver 60-90 cm, graver og klatrer, lever af æg og små hvirveldyr og kræver erfaring, faste rutiner og sikker håndtering.

Familie: Helodermatidae Udgivet 17. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**60-90 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**800-2.000 g**
Levetid	**20-30 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Træboende, jordboende og gravende**
Biotop	**Halvørken og tørskov**
Sværhedsgrad	**Ekspert**

PASNING

Min. terrarie	**180 × 80 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-32 °C**
Temperatur, nat	**20-24 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Vinterhvile	**15-20 °C** 8-12 uger
Kost	**Hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**36 mdr.**
Kuldstørrelse	**3-13 æg**
Inkubation	**208 dage** ved 26 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste II og i EU-bilag B (som hele slægten *Heloderma*). Den tidligere underart *Heloderma horridum charlesbogerti* fra Guatemala står dog på CITES liste I og i EU-bilag A. Indførsel fra lande uden for EU kræver CITES-dokumenter, som udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) efter BEK nr. 1588 af 9.12.2024. Arten er giftig, men står ikke på listen over dyr, som private ikke må holde (BEK nr. 1261 af 17.11.2015). Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav. Få dokumentation for dyrets oprindelse ved køb.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt dokumenteret viden om pasningen af *Heloderma horridum*.
TEMPERATUR	Terrariet skal have en gradient fra 22 til 32 °C om dagen, lånt fra *H. suspectum*; aktive dyr af begge arter holder en kropstemperatur omkring 30 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden er 40-60 %, og en del af bunden holdes let fugtig, så dyret kan grave sig ned i fugtigere jord; tallene er lånt fra *H. suspectum*.
LYS OG UVB	Arten er mest aktiv sidst på eftermiddagen, i skumringen og om natten, men en fast lysrytme giver en naturlig døgnrytme. Lyset tændes 10-13 timer om dagen, kortest i den kølige periode.
FODER	I naturen lever arten især af æg fra fugle og krybdyr og af unger fra reder. Den tager også små fugle, pattedyr, frøer, øgler og insekter. Fedtreserven i halen bærer den gennem tørtiden.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	SIKKERHED: dyret er giftigt og stærkt. Det bider sig fast og kan vende sig overraskende hurtigt, især om aftenen og natten. Brug disse regler: Rør aldrig dyret med bare hænder.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Mexico.