herpy

ORMEPADDER

Taita African Caecilian

Boulengerula taitana

Boulengerula taitana er en lille, benløs ormepadde, som kun findes i Taita-bjergene i det sydøstlige Kenya. Hunnen lægger få æg i et kammer i jorden og bliver hos dem, og de nyklækkede unger lever af hendes yderste hudlag. Arten er truet, og pasningen i fangenskab er næsten ukendt.

Familie: Herpelidae Tidligere navn: *Boulengerula taitanus; Afrocaecilia taitana* Udgivet 17. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**24-30 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Gravende**
Biotop	**Bjergskov**
Hudgift	**Ingen kendt**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**40 × 30 × 30 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**21-24 °C**
Temperatur, nat	**19-22 °C**
Luftfugtighed	**90-100 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Ikke nødvendig**
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Direkte udvikling (ingen larver)**
Æglægning	**På jorden**
Kønsmoden	**24 mdr.**
Æg pr. sæson	**5**
Yngelpleje	**Vogter æggene**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Truet (EN)**

Ikke på CITES-listerne og ikke i EU-bilag A-D. Arten står ikke på listen over forbudte dyr i BEK nr. 1261/2015. Om der gælder dyresundhedskrav ved import af ormepadder, er ikke bekræftet: tjek de aktuelle regler hos Fødevarestyrelsen.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Boulengerula taitana*. Klimaet i Taita-bjergene er tropisk, men mildt på grund af højden, med to regntider, og arten lever i fugtig, løs jord.
TEMPERATUR	Temperaturen i jorden er ikke målt for arten. 21-24 °C om dagen og 19-22 °C om natten er et skøn, der passer til landlevende ormepadder og et mildt bjergklima.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Bunden skal være jævnt fugtig, og luften i kassen er næsten mættet, 90-100 %. Sprøjt bunden med flaskevand, regnvand eller afkloreret postevand, og vend de øverste centimeter af og til, så fugten fordeles.
VAND OG VANDKVALITET	Arten skal ikke have vandskål eller vanddel. Kondens på kassens vægge er nok at drikke af, og vandet bruges kun til at holde bunden fugtig.
LYS OG UVB	Arten lever under jorden og har ikke brug for UVB eller anden belysning. Rummets almindelige døgnrytme med 10-14 timers lys er nok. Kassen holdes mørk og skal ikke stå i direkte sol.
FODER	I naturen æder *Boulengerula taitana* især termitter og regnorme; ungerne tager mest regnorme. I fangenskab er små regnorme det mest realistiske grundfoder.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Boulengerula taitana* lever skjult under jorden, og et sundt dyr ligger nedgravet det meste af tiden. Arten holdes enkeltvis, så vægt og sundhed er lette at følge.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Kenya.