herpy

ORMEPADDER

Congo Caecilian

Herpele squalostoma

Herpele squalostoma er en kraftig, gravende ormepadde fra Centralafrikas regnskov, plantager og haver, op til omkring 46 cm lang. Den lægger æg i jorden, og hunnen ligger rullet om æg og unger, som lever af hendes yderste hudlag. Arten har vist sig hårdfør i fangenskab sammenlignet med andre ormepadder.

Familie: Herpelidae Tidligere navn: *Caecilia squalostoma* Udgivet 17. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**24-46 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Gravende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift	**Ingen kendt**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-25 °C**
Temperatur, nat	**21-23 °C**
Luftfugtighed	**90-100 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Ikke nødvendig**
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Direkte udvikling (ingen larver)**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. sæson	**16**
Yngelpleje	**Vogter æggene**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Ikke på CITES-listerne og ikke i EU-bilag A-D. Arten står ikke på listen over forbudte dyr i BEK nr. 1261/2015. Om der gælder dyresundhedskrav ved import af ormepadder, er ikke bekræftet: tjek de aktuelle regler hos Fødevarestyrelsen.

Pasning i korte træk

TERRARIET

H. squalostoma holdes i små antal, og pasningen bygger på arten selv og andre landlevende ormepadder. Dyret er landlevende og graver, så pasningen handler om jorden.

TEMPERATUR

Arten holdes stabilt og lunt: 22-25 °C om dagen og 21-23 °C om natten. Gennemsnitstemperaturen i jorden påvirker, hvor meget dyrene æder, så den skal holdes jævn. Udsving på mere end omkring 3 °C og hurtige skift tåles dårligt.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING

Luften i kassen er næsten mættet, 90-100 %, fordi jorden er fugtig. Fugten holdes ved at sprøjte jorden og af og til vende de øverste centimeter. Mærk efter, og sprøjt, når det øverste lag føles tørt.

VAND OG VANDKVALITET

Arten skal ikke have vandskål eller vanddel. Fugten kommer fra jorden, og kondens på kassens vægge er nok at drikke af. En vandskål kan gøre jorden for våd.

LYS OG UVB

Arten lever under jorden, og et bestemt lysprogram er ikke nødvendigt. Rummets almindelige døgnrytme med 10-14 timers lys er nok. UVB er ikke nødvendigt, og kassen holdes mørk, så dyret kan grave uforstyrret.

FODER

Regnorme er et velprøvet grundfoder: unge dyr kan vokse op til store, kraftige voksne på regnorme alene, når ormene gødes med kalk og vitaminer. Små til mellemstore regnorme passer, og et voksent dyr får 10-15 orme hver anden uge.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

H. squalostoma tilbringer næsten hele livet under jorden og ses sjældent på overfladen. Arten holdes oftest enkeltvis, så tilstand og tilvækst er lette at følge; flere dyr kan holdes sammen med jævnligt tilsyn.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Nigeria, Cameroun, Ækvatorialguinea, Gabon, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa og Den Centralafrikanske Republik.