herpy

ORMEPADDER

Banna Caecilian

Ichthyophis bannanicus

Ichthyophis bannanicus er Kinas eneste ormepadde, en gravende art fra det sydlige Kina og Vietnam. De voksne lever i fugtig jord ved vandløb og rismarker, hvor hunnen vogter sine æg i et jordkammer. Larverne lever i vand og er rovdyr i omkring to år, før de forvandles. Pasningen i fangenskab er næsten ukendt.

Familie: Ichthyophiidae Udgivet 17. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**30-40 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Gravende**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Hudgift	**Ingen kendt**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**50 × 30 × 35 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, nat	**21-24 °C**
Luftfugtighed	**90-100 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Ikke nødvendig**
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Larver i vand**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. sæson	**24-68**
Larvetid	**730 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Små vanddyr (dafnier, myggelarver)**
Yngelpleje	**Vogter æggene**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Ikke på CITES-listerne og ikke i EU-bilag A-D. Arten står ikke på listen over forbudte dyr i BEK nr. 1261/2015. Om der gælder dyresundhedskrav ved import af ormepadder, er ikke bekræftet: tjek de aktuelle regler hos Fødevarestyrelsen.

Om arten

Ichthyophis bannanicus er en slank, benløs padde, der ligner en stor, blank regnorm, med mange tværgående furer, små øjne under huden og to små følere på hovedet. Voksenstørrelsen er ikke dokumenteret; boksens 30-40 cm er lånt fra *Ichthyophis kohtaoensis*. Vægt, levetid og sikre ydre kønsforskelle er heller ikke dokumenteret.

Arten blev fundet i Yunnan i 1976 og først bestemt som *Ichthyophis glutinosus*, men blev i 1984 beskrevet som ny art ud fra dyr fra Guangxi. Den regnes af nogle for et synonym for *Ichthyophis kohtaoensis*, og nyere kinesisk litteratur bruger begge navne om de samme bestande. Her følges opfattelsen af *I. bannanicus* som selvstændig art.

Livet er todelt: en vandlevende larve med gæller og et landlevende, gravende voksendyr. Der er ikke dokumenteret hudgift hos arten, men huden er tynd og sart, og dyret skal røres så lidt som muligt.

Udbredelse og levested

Ichthyophis bannanicus findes i det sydlige Kina i provinserne Yunnan, Guangxi og Guangdong og i Vietnam, både i nord og i Mekongdeltaet. Dyr fra Laos og Thailand er genetisk henført til arten. Store floder som Den Røde Flod og Perlefloden adskiller bestandene genetisk.

Arten står som ikke truet (LC) på IUCN's rødliste. Lokalt er bestande gået tilbage, og den genetiske historie viser en tilbagegang, der hænger sammen med menneskets omdannelse af levestederne. Til gengæld er arten ofte talrigere i dyrket land, især ved rismarker, end i uberørt natur.

> **Oprindelig udbredelse:** Kina, Vietnam, Laos og Thailand.

LEVESTED

Arten lever i fugtig, løs jord i skov, krat og dyrket land, især nær små vandløb og rismarker; den våde, løse jord i rismarkerne passer den godt. Klimaet er subtropisk til tropisk med regntid og tørtid, og dyrene ses oftest over jorden i regntiden. Arten tåler ikke kulde: under 18 °C går den i dvale eller dør.

De voksne æder især snegle, regnorme, myrer og termitter, og føden skifter mellem tørtid og regntid. Larverne lever i vand og er rovdyr.

Læs mere: Vinterhvile og årstider

Pasning

TERRARIET

Der findes kun lidt viden om pasningen af *Ichthyophis bannanicus*. Klimaet i udbredelsesområdet er varmt og fugtigt med regntid og tørtid, og de voksne lever i våd, løs jord ved vandløb og rismarker. Pasningen bygger på det og på erfaringer med andre gravende ormepadder; den nære slægtning *Ichthyophis kohtaoensis* stiller de samme krav.

Et voksent dyr holdes i en tæt kasse på mindst 50 × 30 × 35 cm med 20-30 cm løs, fugtig bund. Låget skal slutte tæt og have en vægt ovenpå, for dyret presser sig gennem smalle sprækker. Små lufthuller lige under kanten, dækket af fint net, giver luft og holder foderdyrene inde. Brug ublegede papirfibre (papirbaseret strøelse) eller ugødet muldjord; kokosfibre alene kan pakke sig sammen i tarmen. Bunden skal være fugtig hele vejen ned, men uden stående vand. Bark eller et fladt stykke træ på overfladen giver skjul og gør det let at se til dyret. Skift bunden hver 4.-5. måned, eller før, hvis den lugter eller mugner.

TEMPERATUR

Hold 22-26 °C om dagen og 21-24 °C om natten med små, langsomme udsving. Temperaturen må aldrig falde under 18 °C, for så går arten i dvale eller dør. En varmemåtte under en lille del af bunden giver en gradient, så dyret kan vælge. Tjek fugten oftere over varmen, for bunden tørrer hurtigere dér.

Læs mere: Varme og temperatur

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING

Luftfugtigheden skal være 90-100 %, og bunden skal være jævnt fugtig i hele dybden. Sprøjt efter behov, og lad en del af bunden være lidt tørrere, så dyret kan vælge. Fugt med regnvand eller klorfrit vand.

Læs mere: Luftfugtighed, sprøjtning og ventilation

VAND OG VANDKVALITET

Voksne dyr skal ikke have vandskål eller vanddel; de får fugt fra den våde bund og kondens på væggene. Vand er kun nødvendigt til larverne, som lever i vand fra klækningen og indtil forvandlingen. Se afsnittet om avl.

LYS OG UVB

Arten lever under jorden og har ikke brug for UVB. Rummets almindelige døgnrytme er nok. Kassen holdes mørk og skal ikke stå i direkte sol eller ved et vindue.

Læs mere: Lys og UVB

FODER

Små og mellemstore regnorme er grundfoder; skær dem over til unge dyr. Små snegle og termitter kan gives som afveksling, fordi de er en stor del af føden i naturen. Læg 5-10 orme i kassen hver 1.-2. uge, og grav efter rester hver anden uge: mange ubrugte orme betyder, at dyret ikke æder. Ormene overlever i fugtig bund og rådner ikke. Gød ormene med kalk og vitaminer i deres jord nogle dage før fodring.

Dyret finder føden ved lugt med følerne, også i mørke, og ses sjældent æde.

Læs mere: Kalk, vitaminer og tilskud

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Arten lever skjult og graver sig ned, og et sundt dyr ligger nedgravet det meste af tiden. Den er rolig, men slipper ud gennem selv små sprækker. Hold ét dyr pr. kasse, så konkurrence om føden undgås, og det er let at følge, om dyret æder. Dyret bør ikke håndteres; skal det flyttes, så brug rene, våde hænder og kort tid.

Avl

KØNSMODENHED OG KØNSBESTEMMELSE

Alder og størrelse ved kønsmodenhed er ikke dokumenteret, og kønnene kan ikke skelnes sikkert udefra. Avl i fangenskab er ikke beskrevet.

PARRING

Befrugtningen er indre. Parring er ikke beskrevet, men æg er fundet midt i regntiden, så yngletiden følger formentlig regnen. En periode med tydeligt fugtigere bund kan efterligne regntiden, men virkningen er ikke dokumenteret.

ÆG OG LARVER

Hunnen lægger 24-68 æg i et kammer under jorden tæt ved et lille vandløb eller en rismark. Kammeret har to små åbninger op til overfladen, og én eller to voksne hunner ligger hos æggene og vogter dem. Æggene må ikke flyttes eller tørre ud. Fostrene har tre par ydre gæller inden klækningen. Der er ingen yngelpleje efter klækningen. Hvor længe æggene er om at klække, er ikke dokumenteret.

METAMORFOSE

Larverne klækker med gæller og skal i vand. Giv dem et akvarium med rent, stillestående vand og små vanddyr som føde, fx myggelarver; de er rovdyr. Larvetiden er omkring to år. Ved forvandlingen forsvinder gællerne og halefinnen, og dyret skal så have adgang til land med fugtig bund, så det kan kravle op og grave sig ned.

OPDRÆT AF UNGER

Efter forvandlingen flyttes dyret til en kasse med fugtig bund som de voksnes og får små orme eller ormestykker. Hold fugten høj og temperaturen jævn, og tjek bunden ofte, så de små dyr hverken tørrer ud eller ligger i stående vand. Videre opdræt er ikke dokumenteret.

Sundhed og typiske fejl

Der er næsten ingen viden om sygdomme hos arten i fangenskab. Hos ormepadder generelt er hudbetændelse den hyppigste kendte dødsårsag. De vigtigste fejl i pasningen er:

- For våd eller for tør bund: dyret bliver på overfladen. Ret fugten, eller skift bunden.
- For koldt: under 18 °C går arten i dvale eller dør. Hold temperaturen stabil.
- Udslip gennem sprækker: dyret tørrer ud. Brug tætte låg med vægt.
- Snavset bund og døde orme giver hudproblemer. Fjern rester løbende.
- Hvide belægninger, sår eller hævelser kræver dyrlæge.

Chytridsvamp (Bd) findes hos vilde dyr af arten: omkring hvert tolvte dyr i en undersøgt bestand var smittet. Nye dyr sættes derfor i karantæne, og hænder og redskaber vaskes mellem kasserne. Gå til en dyrlæge med forstand på padder, hvis dyret ikke æder, bliver på overfladen i flere dage eller får sår.

Læs mere: Karantæne og hygiejne

Spørg altid dine kloge bekendte

Vejledningen er et godt sted at begynde, men den kan ikke erstatte erfaring. Dyr er forskellige, og meget af det vigtigste lærer man af dem, der har holdt arten i årevis. Tal med en avler, en erfaren holder eller en dyrlæge med forstand på krybdyr og padder, før du anskaffer dyret - og igen, hvis noget ser forkert ud.