herpy

ORMEPADDER

Aqua Ize Caecilian

Schistometopum thomense

Schistometopum thomense er en benløs, gravende ormepadde, der kun lever på São Tomé og den lille nabo-ø Ilhéu das Rolas i Guineabugten. Den er ofte klart gul, føder levende, færdigudviklede unger og er en af de få ormepadder, der er opdrættet i fangenskab. Pasningen handler om dyb, fugtig jord uden gødning og sprøjtegift.

Familie: Dermophiidae Udgivet 17. november 2026 **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**20-34 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag og nat**
Levevis	**Gravende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**50 × 30 × 30 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**21-24 °C**
Temperatur, nat	**20-22 °C**
Luftfugtighed	**85-100 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Ikke nødvendig**
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Udvikling	**Levendefødende**
Kønsmoden	**24 mdr.**
Kuldstørrelse	**1-16 unger**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Ikke på CITES-listerne og ikke i EU-bilag A-D. Arten står ikke på listen over forbudte dyr i BEK nr. 1261/2015. Om der gælder dyresundhedskrav ved import af ormepadder, er ikke bekræftet: tjek de aktuelle regler hos Fødevarestyrelsen.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Arten er landlevende og graver, så pasningen handler om jorden. Den holdes og opdrættes i små antal, og pasningen bygger på arten selv og på andre landlevende ormepadder.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen er 21-24 °C og nattemperaturen 20-22 °C, hvilket svarer til jorden i artens bjergskove. Opvarmning er som regel ikke nødvendig i et rum med stabil temperatur.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden i kassen ligger på 85-100 %, fordi jorden er fugtig. Fugten holdes ved at sprøjte jorden og af og til vende de øverste centimeter.
VAND OG VANDKVALITET	Arten skal ikke have vandskål eller vanddel. Fugten kommer fra jorden, og kondens på kassens vægge er nok at drikke af. Den svømmer meget klodset, og dybt vand er en drukningsfare.
LYS OG UVB	Arten er aktiv både dag og nat og viser sig i begyndelsen ofte på overfladen; efter nogle ugers tilvænning ses den sjældnere. Et bestemt lysprogram er ikke nødvendigt, og rummets almindelige døgnrytme med 10-14 timers lys er nok.
FODER	Regnorme er grundfoder, og voksmøllarver tages også. Et voksent dyr får 10-15 små regnorme hver anden uge. Grav jævnligt igennem jorden: mange tilbageværende orme betyder overfodring eller et dyr, der ikke æder.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*S. thomense* graver omfattende gangsystemer. I naturen ligger flere dyr samlet i samme træstub. Arten kan stikke hovedet op af jorden og blive liggende sådan i op til 20 minutter uden at reagere på bevægelser i nærheden.
OPRINDELIG UDBREDELSE	São Tomé og Príncipe.