herpy

ORMEPADDER

Boettger's Caecilian

Siphonops paulensis

Siphonops paulensis er en benløs, gravende ormepadde fra Brasilien, Paraguay, Bolivia og det nordlige Argentina. Den lever under jorden i åbent land, skov og haver, og hunnen vogter sine få æg, som klækker direkte til små unger. Huden afgiver et sekret, der opløser røde blodlegemer.

Familie: Siphonopidae Udgivet 17. november 2026 **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**30-35 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Gravende**
Biotop	**Savanne, tørskov og regnskov**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**50 × 30 × 35 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, nat	**20-24 °C**
Luftfugtighed	**90-100 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Ikke nødvendig**
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Direkte udvikling (ingen larver)**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. sæson	**4-6**
Yngelpleje	**Vogter æggene**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Ikke på CITES-listerne og ikke i EU-bilag A-D. Arten står ikke på listen over forbudte dyr i BEK nr. 1261/2015. Om der gælder dyresundhedskrav ved import af ormepadder, er ikke bekræftet: tjek de aktuelle regler hos Fødevarestyrelsen.

Om arten

Siphonops paulensis er en ormepadde: en benløs, gravende padde, der ligner en stor regnorm. Kroppen er cylindrisk og delt af ringformede furer, og hovedet er stærkt forbenet og bruges til at bore sig gennem jorden. Et voksent dyr på 32 cm vejer omkring 26 g, og boksens 30-35 cm bygger på det; størrelsen svarer omtrent til den nære slægtning *Siphonops annulatus*. Levetid og sikre ydre kønsforskelle er ikke dokumenteret, og levetiden i boksen er et skøn.

Hudgift: hudens sekret opløser røde blodlegemer, også menneskers, og kan stoppe hjertet hos tudser i laboratorieforsøg; virkningen på hjertet skyldes kalium, der frigøres fra de ødelagte blodlegemer. Virkningen på mennesker ved almindelig håndtering er ikke dokumenteret. Vask hænder før og efter håndtering, og rør ikke øjne og mund bagefter.

Arten lægger æg i jorden, og ungerne udvikles direkte uden larvestadie i vand. Hos *S. annulatus* æder ungerne hunnens yderste hudlag; om det samme gælder *S. paulensis*, er ikke dokumenteret.

Udbredelse og levested

Siphonops paulensis er vidt udbredt i Sydamerika: Brasilien fra nordøst til syd, Paraguay, det østlige Bolivia og det nordlige Argentina. De fleste fund er fra Brasilien, og nye fund udvider stadig den kendte udbredelse. Arten er lokalt almindelig og regnes ikke for truet.

> **Oprindelig udbredelse:** Brasilien, Paraguay, Bolivia og Argentina.

LEVESTED

Siphonops paulensis lever under jorden i skov, savanne, buskads og græsland, gerne i åbent land og i skov langs vandløb. Arten tåler menneskelig påvirkning og findes også i haver og inde i byer. Den ses sjældent på overfladen. Hvad arten æder i naturen, er dårligt kendt.

Pasning

TERRARIET

Der findes kun lidt viden om pasningen af *Siphonops paulensis*. Den nære slægtning *Siphonops annulatus* er bedre kendt i fangenskab, og pasningen bygger på den og på erfaringer med andre landlevende ormepadder.

Et voksent dyr holdes i en tæt, tykvægget plastikkasse på mindst 50 × 30 × 35 cm med 20-25 cm løs, fugtig bund. Låget skal slutte tæt og have en vægt ovenpå, for ormepadder finder hver sprække. Brug ublegede papirfibre (papirbaseret strøelse) eller steriliseret muldjord uden gødning; kokosfibre alene kan pakke sig sammen i tarmen. Bunden skal være fugtig, men ikke så våd, at man kan presse vand ud af en håndfuld, og der må ikke stå vand i bunden. Et fladt stykke bark eller træ på overfladen giver et skjul lige under overfladen og gør det let at se til dyret. Små lufthuller i siderne, dækket af fint net, giver ventilation og holder foderdyrene inde; låget skal være uden huller. Bunden skiftes hver 4.-5. måned.

TEMPERATUR

Siphonops paulensis holdes ved 22-26 °C om dagen og 20-24 °C om natten; tallene er lånt fra *S. annulatus*, der trives dårligt uden opvarmning. En varmemåtte under den ene ende af kassen giver en varmere og tørrere zone, så dyret selv kan vælge. Temperaturen skal være stabil, og hurtige udsving skal undgås. Et dyr, der ligger på overfladen i stedet for at grave, har det for varmt, for koldt, for vådt eller for tørt.

Læs mere: Varme og temperatur

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING

Bunden skal være jævnt fugtig, og luften i kassen er næsten mættet, 90-100 %. Sprøjt bunden med flaskevand, regnvand eller afkloreret postevand, og vend de øverste centimeter af og til, så fugten fordeles. Lad ikke vand samle sig i bunden. Kondens på væggene er normalt.

VAND OG VANDKVALITET

Arten skal ikke have vandskål eller vanddel. Kondens på kassens vægge er nok at drikke af, og vandet bruges kun til at holde bunden fugtig. Brug aldrig postevand med klor eller kloramin, og undgå sæbe, rengøringsmidler og håndcreme på hænder og redskaber, fordi padder optager stoffer gennem huden.

LYS OG UVB

Arten lever under jorden og har ikke brug for UVB eller anden belysning. Rummets almindelige døgnrytme med 10-14 timers lys er nok. Kassen skal ikke stå i direkte sol.

Læs mere: Lys og UVB

FODER

Regnorme er grundfoder og tages af næsten alle landlevende ormepadder. Brug regnorme af passende størrelse, fx kompostorme, og klip dem i stykker til små dyr. I en papirbund kan ormene leve i lang tid uden at dø og rådne.

Et voksent dyr får 10-15 orme hver anden uge. Grav igennem bunden mindst hver anden uge: mange tilbageværende orme betyder overfodring eller et dyr, der ikke æder. Ormene kan gødes med kalk og vitaminer i deres jord nogle dage før fodring. Dyret ses sjældent æde, så tæl ormene ind den første måned.

Læs mere: Kalk, vitaminer og tilskud

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Siphonops paulensis lever skjult under jorden, og et sundt dyr ligger nedgravet det meste af tiden. Er dyret ofte på overfladen, er bunden for våd, for tør, for kold, for varm eller kemisk uegnet, eller der mangler et skjul nær overfladen. Arten holdes enkeltvis, så vægt og sundhed er lette at følge. Håndtering bør undgås på grund af hudsekretet; skal dyret flyttes, så brug rene, fugtige hænder eller handsker.

Avl

KØNSMODENHED OG KØNSBESTEMMELSE

Alder og størrelse ved kønsmodenhed er ikke dokumenteret, og kønnene kan ikke skelnes sikkert udefra. Et dyrs køn er derfor uvist, indtil det eventuelt yngler.

PARRING

Befrugtningen er indre. Hvordan parringen foregår, og hvilke forhold der udløser parring og æglægning, er ikke dokumenteret. Avl i fangenskab er ikke beskrevet.

ÆG OG LARVER

Siphonops paulensis lægger 4-6 æg i jorden, og hunnen bliver hos æggene og vogter dem. Ungerne udvikles direkte uden larvestadie i vand. Hos *Siphonops annulatus* bliver de nyklækkede unger hos hunnen, æder hendes yderste hudlag og samles om hendes kloak; om *S. paulensis* gør det samme, er ikke dokumenteret. Unger skal derfor have lov at blive hos hunnen, til de selv graver og æder.

METAMORFOSE

Der er ingen larver og ingen forvandling: ungerne klækker som små udgaver af de voksne. Hvor længe æggene er om at klække, og hvornår ungerne forlader hunnen, er ikke dokumenteret. Hunnen skal have ro, mens hun ligger med æg eller unger.

OPDRÆT AF UNGER

Unger flyttes ikke fra hunnen, før de selv graver og æder. Derefter holdes de i en lille, dyb kasse med samme bund som de voksne og får små regnorme eller ormestykker. Hold bunden jævnt fugtig og temperaturen stabil. Der findes ingen opdrætsvejledning for arten.

Sundhed og typiske fejl

Sundhedsbilledet bygger på erfaringer med andre landlevende ormepadder. De hyppigste problemer er:

- Dyret ligger på overfladen: bunden er for våd, for tør, for varm, for kold eller kemisk uegnet. Ret forholdene, og skift bunden.
- Forstoppelse: kokosfibre kan pakke sig sammen til en prop i tarmen. Brug papirfibre eller steril jord.
- Udslip: låget skal slutte tæt og have en vægt ovenpå.
- Hudbetændelse er den hyppigste kendte dødsårsag hos ormepadder i fangenskab. Hold bunden ren, og se på huden ved hvert eftersyn.
- Chytridsvamp (Bd) er påvist hos ormepadder. Nye dyr sættes i karantæne, og hænder og redskaber vaskes mellem kasserne.

Gå til en dyrlæge med forstand på padder, hvis dyret ikke æder i flere uger, taber sig eller får sår på huden.

Læs mere: Karantæne og hygiejne

Spørg altid dine kloge bekendte

Vejledningen er et godt sted at begynde, men den kan ikke erstatte erfaring. Dyr er forskellige, og meget af det vigtigste lærer man af dem, der har holdt arten i årevis. Tal med en avler, en erfaren holder eller en dyrlæge med forstand på krybdyr og padder, før du anskaffer dyret - og igen, hvis noget ser forkert ud.