herpy

ORMEPADDER

Rubber Eel

Typhlonectes natans

Typhlonectes natans er en helt vandlevende, benløs padde fra Colombia og Venezuela med en lang, glat og mørkt blågrå krop, små øjne under huden og en lav rygfinne. Arten føder levende unger og holdes i et varmt, blødt og godt filtreret akvarium med et tungt, tætsluttende låg.

Familie: Typhlonectidae Udgivet 17. november 2026 **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**25-73 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**40-250 g**
Levetid	**10-14 år**
Aktiv	**Dag, skumring og nat**
Levevis	**Akvatisk**
Biotop	**Savanne og vådområde**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 45 × 50 cm** L × B × H til 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-30 °C**
Temperatur, nat	**24-30 °C**
Luftfugtighed	**100 %**
Vand	**Akvaterrarie** dybde 30-40 cm
Vandtemperatur	**24-30 °C**
UVB	**Ikke nødvendig**
Kost	**Insekter, færdigfoder, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**I gruppe**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Udvikling	**Levendefødende**
Kønsmoden	**48 mdr.**
Kuldstørrelse	**1-11 unger**
Drægtighed	**210-300 dage**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES-listerne eller i EU-bilag A-D og står ikke på listen over dyr, som private ikke må holde (BEK nr. 1261/2015). Tjek de aktuelle regler for import og dyresundhed hos Fødevarestyrelsen.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Typhlonectes natans holdes i et akvarium. Tre voksne dyr skal have mindst 120 × 45 × 50 cm (omkring 250 liter) med et stort udvendigt filter. Jo større vandmængde, desto mere stabil er vandkvaliteten.

TEMPERATUR

Vandtemperaturen skal være 24-30 °C. En naturlig årstidsvariation inden for det område efterligner floderne i udbredelsesområdet og kan hjælpe avlen på vej. Omkring 32 °C giver varmestress.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING

Luftfugtigheden har ingen betydning, for dyret lever i vandet. Luften under et tætsluttende låg er mættet med fugt, og derfor står der 100 % i boksen. Det, der tæller, er vandets kvalitet; se afsnittet om vand.

VAND OG VANDKVALITET

Ormepadder optager stoffer gennem huden, så vandkvaliteten er afgørende. Filtret skal være indkørt, før dyrene kommer i. Postevand behandles med vandbehandler, luftes og står et døgn ved akvariets temperatur, før det fyldes på.

LYS OG UVB

Almindeligt akvarielys 12 timer i døgnet er nok. Dyrene foretrækker mørke, så der skal altid være mørke skjul. Behovet for UVB er ikke kendt, og UVB-lys giver ingen påviselig forskel på knoglerne, så det er ikke nødvendigt.

FODER

Typhlonectes natans æder næsten alt kødfoder: regnorme, fårekyllinger, billelarver, rejer og andre krebsdyr, muslinger, myggelarver, optøede fisk, nyfødte mus og færdigfoder til padder.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Arten er fredelig, ikke territorial og trives bedst i en gruppe, hvor dyrene deler skjul. Under fodring kan de bide hinanden i iveren efter maden, og i yngletiden kan hannerne være aggressive over for hinanden og jage hunnerne.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Colombia og Venezuela.