herpy

PILEGIFTFRØER

Brazil-nut Poison Frog

Adelphobates castaneoticus

Adelphobates castaneoticus er en lille, lakblank sort pilegiftfrø med hvide eller gullige pletter og lysende orange pletter ved forben og knæ. Den lever på skovbunden i delstaten Pará i det brasilianske Amazonas og er opkaldt efter paranøddden, hvis tomme skaller hannen bruger som vandbassin til haletudserne. Der findes kun lidt viden om pasningen.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates castaneoticus* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**18-23 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**8-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Temperatur, nat	**20-24 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Kønsmoden	**5-7 mdr.**
Æg pr. lægning	**4-8**
Klækning	**10-14 dage**
Larvetid	**60-90 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og andre haletudser**
Yngelpleje	**Vogter æggene og bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Hele slægten Adelphobates står på CITES liste II, så international handel kræver CITES-papirer. Bed sælgeren om dokumentation for, at dyret er opdrættet i fangenskab, og gem papirerne. EU-bilaget er ikke aflæst for frøer og nævnes derfor ikke.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Adelphobates castaneoticus*. Arten lever i løvlaget på skovbunden i et varmt og fugtigt lavlandsklima.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen skal ligge på 24-27 °C, og om natten falder den 3-4 °C, til 20-24 °C. Udsvinget over året skal være lille, 1-2 °C. Det passer med lavlandsklimaet i Pará. Der skal ikke være noget solpunkt og ingen varmelampe.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden skal være omkring 70-80 % midt på dagen og tæt på 100 % morgen og aften, og løvlaget og substratet skal være fugtigt hele tiden.
VAND OG VANDKVALITET	En vandskål er ikke nødvendig, medmindre man vil have yngel. Frøerne får fugten fra sprøjtning og det fugtige løv.
LYS OG UVB	Giv 10-12 timers lys om dagen med lysstofrør eller LED til planterne. I naturen lever arten i skyggen under skovens kroner, så lyset skal give planterne nok til at gro uden at varme terrariet op.
FODER	*A. castaneoticus* lever i naturen af myrer, termitter og andre små leddyr. I fangenskab fodres med springhaler, små bananfluer og små isopoder.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*A. castaneoticus* er dagaktiv og lever mest på skovbunden. Temperament og territorieadfærd er ikke dokumenteret, men *A. galactonotus* kan blive aggressiv over for artsfæller, når den bliver kønsmoden.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Brasilien.