herpy

PILEGIFTFRØER

Splash-backed Poison Frog

Adelphobates galactonotus

Adelphobates galactonotus er en af de store pilegiftfrøer og kendes på sit klare farvefelt over ryggen i orange, gul, rød eller blå mod sorte ben og sider. Den er dagaktiv, bliver ca. 4 cm og lever i Brasiliens regnskov syd for Amazonfloden. Den er mere tilbageholdende end de mest almindelige pilegiftfrøer, og avlen følger i højere grad årstiderne.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates galactonotus* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**4 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-20 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 45 × 45 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-25 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Kønsmoden	**8-12 mdr.**
Æg pr. lægning	**4-8**
Klækning	**14 dage**
Larvetid	**60-90 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Vogter æggene og bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Hele slægten Adelphobates står på CITES liste II, så international handel kræver CITES-papirer. Bed sælgeren om dokumentation for, at dyret er opdrættet i fangenskab, og gem papirerne. EU-bilaget er ikke aflæst for frøer og nævnes derfor ikke.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et par *Adelphobates galactonotus* skal have et terrarie på mindst 60 × 45 × 45 cm (ca. 120 liter). Frøen er stor og æder meget, og gulvarealet er vigtigere end højden, så vælg hellere et bredt og dybt terrarie end et højt.
TEMPERATUR	*Adelphobates galactonotus* trives ved ca. 21-25 °C om dagen, og om natten må temperaturen falde til 18-21 °C. Arten tåler 18-27 °C, men trives bedst omkring 21-24 °C. Der skal ikke være noget varmt solpunkt og ingen varmelampe.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden skal ligge på 70-100 %.
VAND OG VANDKVALITET	*Adelphobates galactonotus* har ikke brug for en vandskål eller et vandfald, når terrariet sprøjtes jævnligt og har et fugtigt løvlag.
LYS OG UVB	UVB er valgfrit for *Adelphobates galactonotus*. Vælger man at give det, skal det være svagt (Ferguson-zone 1) og kombineres med tæt skygge, og det erstatter ikke kosttilskud.
FODER	*Adelphobates galactonotus* æder små leddyr. Flyveløse bananfluer er basisfoder: voksne dyr tager både *Drosophila melanogaster* og passende store *D. hydei*, mens nyforvandlede unger skal have de mindste.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Adelphobates galactonotus* er dagaktiv og ret rolig. Den er mindre fremme end de dristigste pilegiftfrøer og gemmer sig gerne, men etablerede dyr kan være ret synlige, når der er rigeligt med dækning.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Brasilien.