herpy

PILEGIFTFRØER

Rio Madeira Poison Frog

Adelphobates quinquevittatus

Adelphobates quinquevittatus er en meget lille, lakblank sort pilegiftfrø på 14-16 mm med hvide striber og grå, grønlige eller orange ben. Den lever i regnskovens løvlag i Madeira-flodens afvandingsområde i det sydlige Amazonas og holdes kun sjældent. Der findes meget lidt viden om pasningen.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates quinquevittatus* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**14-16 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**8-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Temperatur, nat	**20-24 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. lægning	**4-8**
Klækning	**10-14 dage**
Larvetid	**60-90 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og andre haletudser**
Yngelpleje	**Bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Hele slægten Adelphobates står på CITES liste II, så international handel kræver CITES-papirer. Bed sælgeren om dokumentation for, at dyret er opdrættet i fangenskab, og gem papirerne. EU-bilaget er ikke aflæst for frøer og nævnes derfor ikke.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Der findes meget lidt viden om pasningen af *Adelphobates quinquevittatus*. Arten lever i løvlaget i et varmt og fugtigt lavlandsklima.

TEMPERATUR

Dagtemperaturen skal ligge på 24-27 °C, og om natten falder den 3-4 °C, til 20-24 °C. Udsvinget over året skal være lille, 1-2 °C. Det passer med lavlandsklimaet i Rondônia. Der skal ikke være noget solpunkt og ingen varmelampe.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING

Luftfugtigheden skal være omkring 70-80 % midt på dagen og tæt på 100 % morgen og aften, og løvlaget og substratet skal være fugtigt hele tiden.

VAND OG VANDKVALITET

En vandskål er ikke nødvendig, medmindre man vil have yngel. Frøerne får fugten fra sprøjtning og det fugtige løv.

LYS OG UVB

Giv 10-12 timers lys om dagen med lysstofrør eller LED til planterne. I naturen lever arten i skyggen under skovens kroner, så lyset skal give planterne nok til at gro uden at varme terrariet op.

FODER

A. quinquevittatus lever i naturen mest af myrer og termitter. I fangenskab fodres med små bananfluer (*Drosophila melanogaster*), springhaler, mikrofårekyllinger, små voksmøllarver, sigtet engplankton og små isopoder.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

A. quinquevittatus er dagaktiv og lever mest i løvlaget. Temperament og territorieadfærd er ikke dokumenteret.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Brasilien.