herpy

PILEGIFTFRØER

## Brilliant-thighed Poison Frog

# *Allobates femoralis*

*Allobates femoralis* er en lille, mørk frø på 3-4 cm fra Amazonas og Guyanaskjoldet med en orangegul plet bag armen og en halvmåneformet orange plet på låret. Den er dagaktiv og jordlevende, hannerne forsvarer territorier med et højt kald, og frieriet er et af de længste blandt pilegiftfrøerne. Arten hører til familien Aromobatidae og regnes for ugiftig.

Familie: Aromobatidae  Tidligere navn: *Epipedobates femoralis; Phyllobates femoralis; Dendrobates femoralis*  Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **3-4 cm**<br>snude-kloak-længde |
| Levetid | **5-10 år** |
| Aktiv | **Dag** |
| Levevis | **Jordboende** |
| Biotop | **Regnskov** |
| Hudgift | **Ingen kendt** |
| Sværhedsgrad | **Erfaren** |

### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **60 × 40 × 40 cm**<br>L × B × H til 2 voksne dyr |
| Temperatur, dag | **25-28 °C** |
| Temperatur, nat | **21-24 °C** |
| Luftfugtighed | **70-100 %** |
| Vand | **Vandskål**<br>dybde 1-2 cm |
| UVB | **Valgfri**<br>Ferguson-zone 1 |
| Kost | **Små leddyr (springhaler, bananfluer)** |
| Holdes | **Parvis eller 1 han med flere hunner** |

### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Æglæggende** |
| Udvikling | **Haletudserne bæres til vand** |
| Æglægning | **På jorden** |
| Æg pr. lægning | **8-20** |
| Klækning | **15-20 dage** |
| Larvetid | **40-50 dage**<br>fra klækning til metamorfose |
| Larvefoder | **Alger/planter** |
| Yngelpleje | **Vogter æggene og bærer haletudserne** |

### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Appendiks II** |
| IUCN | **Ikke truet (LC)** |

Står på CITES liste II, så handel over landegrænser kræver CITES-papirer, og sælgeren bør kunne dokumentere, at dyrene er lovligt opdrættet. De fleste andre arter i slægten er ikke listet, så sørg for, at navnet i papirerne passer. EU-bilaget er ikke aflæst og er derfor udeladt.

## Pasning i korte træk

**TERRARIET**
Et par *Allobates femoralis* kan holdes i et glasterrarie på 60 × 40 × 40 cm, og mindst 50 × 50 × 50 cm nævnes også. Arten lever ved jorden, så gulvarealet tæller mest, men hannerne klatrer gerne lidt op for at kalde.

**TEMPERATUR**
Dagtemperaturen skal ligge på 25-28 °C, og om natten sænkes den 3-4 grader. Et dagligt forløb fra omkring 21 °C om natten til 28 °C om dagen svarer til forholdene i Fransk Guyana og har givet gode resultater med avl.

**LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING**
Luftfugtigheden skal være høj: 70-80 % midt på dagen og op mod 100 % morgen og aften.

**VAND OG VANDKVALITET**
Giv en lav glasskål på omkring 10 cm i diameter med 1-2 cm vand, som frøerne let kommer op af. Den bruges også af hannen, når han skal af med haletudserne. Brug regnvand, osmosevand eller afkloreret postevand, og skift vandet ofte.

**LYS OG UVB**
Lyset er først og fremmest til planterne. 12 timers lys om dagen, fx fra kl. 7 til 19, har fungeret godt, og lysstofrør eller LED på omkring 6.500 K giver naturlige farver og god plantevækst.

**FODER**
*Allobates femoralis* lever af små insekter. I terrariet består grundfoderet af vingeløse bananfluer, suppleret med springhaler, helt små fårekyllinger, små voksmøllarver og engplankton.

**ADFÆRD OG HÅNDTERING**
*Allobates femoralis* er dagaktiv, og hannerne er territoriale.

**OPRINDELIG UDBREDELSE**
Bolivia, Brasilien, Colombia, Ecuador, Fransk Guyana, Guyana, Peru og Surinam.