herpy

PILEGIFTFRØER

Sanguine Poison Frog

Allobates zaparo

Allobates zaparo er en lille, dagaktiv frø på omkring 3 cm fra regnskoven ved Andesfoden i Ecuador og det nordlige Peru. Voksne har rød ryg, sorte sider, blå bug og gule pletter ved benene og efterligner de giftige *Ameerega bilinguis* og *Ameerega parvula*, men er selv ugiftige. Arten holdes kun sjældent, så pasningen bygger på klimaet og på slægtningen *Allobates femoralis*.

Familie: Aromobatidae Tidligere navn: *Epipedobates zaparo; Phyllobates zaparo; Dendrobates zaparo* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**3 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift	**Ingen kendt**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Temperatur, nat	**21-23 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. lægning	**8-20**
Klækning	**15-20 dage**
Larvetid	**40-50 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES bilag II, så handel over grænser kræver CITES-papirer. De fleste andre arter i slægten *Allobates* er ikke listet, så sørg for, at navnet i papirerne passer. Køb kun dyr, der kan dokumenteres som opdrættede. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Allobates zaparo*. Arten holdes kun sjældent, og avl i fangenskab er ikke beskrevet.
TEMPERATUR	Hold terrariet på 24-27 °C om dagen og 21-23 °C om natten. Tallene følger klimaet i Ecuadors lavland ved Andesfoden og ligger lidt under dem, der gælder for *Allobates femoralis* (25-28 °C om dagen).
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden skal være 70-80 % midt på dagen og tæt på 100 % morgen og aften. Et regnanlæg med timer, der giver to korte byger om dagen, holder løvlaget fugtigt og frøerne aktive; en forstøver hjælper i morgen- og aftentimerne.
VAND OG VANDKVALITET	Giv en lav glasskål med 1-2 cm vand, som frøerne let kommer op af. Skålen bruges af de voksne, når haletudserne skal sættes af. Brug regnvand, osmosevand eller afkloreret postevand, og skift det ofte.
LYS OG UVB	Lyset er først og fremmest til planterne: 10-12 timer om dagen med LED-lys med planteegnet spektrum. Det er ikke dokumenteret, at *Allobates zaparo* har brug for UVB.
FODER	I naturen er myrer en vigtig del af kosten. I terrariet består grundfoderet af flyveløse bananfluer (*Drosophila melanogaster*), springhaler og sigtet engplankton, suppleret med helt små fårekyllinger og små isopoder.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Allobates zaparo* er dagaktiv og lever på løvlaget. Hannerne kalder fra oversiden af løvet for at tiltrække hunner.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Ecuador og Peru.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/pilegiftfroer/allobates-zaparo