herpy

PILEGIFTFRØER

Pleasing Poison Frog

Ameerega bassleri

Ameerega bassleri er en dagaktiv pilegiftfrø på knap 4 cm fra de fugtige skove ved Andes' østfod i det nordlige Peru. Hannen passer æggene og bærer haletudserne til vandet, og arten skal holdes køligere end de fleste pilegiftfrøer. Der findes kun lidt viden om pasningen, og arten er sårbar i naturen.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Epipedobates bassleri; Dendrobates bassleri; Phobobates bassleri* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**4 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**8-12 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**50 × 50 × 55 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**18-21 °C**
Temperatur, nat	**13-17 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**I bladkar (fx bromelier)**
Kønsmoden	**12-13 mdr.**
Æg pr. lægning	**40**
Klækning	**10 dage**
Larvetid	**50-60 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Vogter æggene og bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Alle arter i slægten Ameerega står på CITES bilag II, så handel over grænser kræver CITES-papirer. Opdrættede dyr bør sælges med dokumentation for afstamning. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der findes kun lidt viden om pasningen af *Ameerega bassleri*. Arten lever i fugtig skov ved bække i 300-1.200 m højde, hvor luften er køligere end hos de fleste pilegiftfrøer.

TEMPERATUR
Arten må ikke holdes for varmt. Om dagen passer 18-21 °C, og om natten skal temperaturen falde 4-6 °C, til omkring 13-17 °C. Forskellen mellem årstiderne er kun 1-2 °C.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING
Luftfugtigheden skal være 70-100 %. Morgen og aften er den tæt på 100 % med tåge, mens den midt på dagen må falde til omkring 70 %.

VAND OG VANDKVALITET
En vandskål med 1-2 cm vand skal være i terrariet, og et fast vandparti eller små beholdere bruges til haletudserne ved yngel. Brug regnvand eller osmosevand og skift vandet flere gange om ugen.

LYS OG UVB
Arten lever på skovbunden, hvor kun lidt lys når ned. LED-lys med planteegnet spektrum og 10-12 timers dagslængde er nok.

FODER
Arten tager de almindelige små foderdyr: bananfluer, springhaler, nyklækkede fårekyllinger, de mindste voksmøllarver og ketsjede småinsekter fra engen. Fodr hver anden dag med så meget, som dyrene æder på omkring en time.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Arten er dagaktiv og lever på jorden. Hannen er territorial og kalder for at forsvare sit område, så dyrene skal have mange gemmesteder og afbrudte synslinjer. Et par kan holdes sammen; flere hanner i samme terrarie giver strid.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Peru.