herpy

PILEGIFTFRØER

Pleasing Poison Frog

Ameerega bassleri

Ameerega bassleri er en dagaktiv pilegiftfrø på knap 4 cm fra de fugtige skove ved Andes' østfod i det nordlige Peru. Hannen passer æggene og bærer haletudserne til vandet, og arten skal holdes køligere end de fleste pilegiftfrøer. Der findes kun lidt viden om pasningen, og arten er sårbar i naturen.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Epipedobates bassleri; Dendrobates bassleri; Phobobates bassleri* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**4 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**8-12 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**50 × 50 × 55 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**18-21 °C**
Temperatur, nat	**13-17 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**I bladkar (fx bromelier)**
Kønsmoden	**12-13 mdr.**
Æg pr. lægning	**40**
Klækning	**10 dage**
Larvetid	**50-60 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Vogter æggene og bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Alle arter i slægten Ameerega står på CITES bilag II, så handel over grænser kræver CITES-papirer. Opdrættede dyr bør sælges med dokumentation for afstamning. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet.

Om arten

Ameerega bassleri (Melin, 1941) er en middelstor pilegiftfrø i slægten *Ameerega*. Voksne dyr måler omkring 35-38 mm fra snude til kloak, og hunnen er lidt større end hannen. Der findes flere lokale former, som opkaldes efter fundstedet, fx 'Saposa' og 'Sisa'. Andre kønsforskelle end størrelsen og hannens kald er ikke dokumenteret.

Arten har tidligere heddet *Dendrobates bassleri*, *Phyllobates bassleri*, *Epipedobates bassleri* og *Phobobates bassleri*. Artsnavnet hylder den amerikanske geolog Harvey Bassler. *Ameerega pepperi*, *Ameerega cainarachi* og *Ameerega yoshina* ligner arten meget og skelnes bedst på hannens kald.

Pilegiftfrøer i slægten *Ameerega* får alkaloiderne i huden fra små leddyr i føden. Opdrættede dyr, der ikke får disse leddyr, er ikke giftige. Vildfangne dyr regnes for milde: vask hænder før og efter kontakt, og rør ikke øjne og mund.

Læs mere: Køb af dyr: opdræt, vildfang og transport

Udbredelse og levested

A. bassleri findes kun i Peru, i Amazonas' afvandingsområde ved Río Huallaga, i højder fra omkring 270 til 1.200 m. Udbredelsen omfatter blandt andet nationalparkerne Cordillera Azul og Cordillera Escalera.

> **Oprindelig udbredelse:** Peru.

LEVESTED

Arten lever i fugtig tropisk skov i lavlandet ved bjergfoden og i bjergskovene, i både uberørt og let forstyrret skov. Dyrene findes sjældent mere end 300 m fra et vandløb. På lave højder holder de sig til fugtige steder tæt ved bække, og højere oppe er de mindre bundet til vandet. Haletudserne vokser op i små skovtjørne og bække. Klimaet er fugtigt og køligere end i Amazonas-lavlandet, og temperaturen svinger kun lidt hen over året.

Arten kan lokalt være meget almindelig, men er sårbar på grund af tab af levested til landbrug og kvægdrift. Fangst til dyrehandel anses ikke for en trussel mod arten som helhed, men enkelte farvevarianter kan hurtigt blive overfisket.

Læs mere: Opdræt af haletudser

Pasning

TERRARIET

Der findes kun lidt viden om pasningen af *Ameerega bassleri*. Arten lever i fugtig skov ved bække i 300-1.200 m højde, hvor luften er køligere end hos de fleste pilegiftfrøer. *Ameerega pepperi* og *Ameerega cainarachi* lever i samme del af Peru og har lignende krav. I slægten er *Ameerega trivittata* den bedst kendte i fangenskab, men den kommer fra varmere lavland, så dens tal kan ikke bruges direkte.

Et regnskovsterrarie på mindst 50 × 50 × 55 cm (længde, bredde, højde) passer til to voksne dyr. Bunden bygges bioaktiv med drænlag, net og fugtig jord, dækket af et tykt løvlag. Indret med bromelier, mos, grene, rødder og korkbark, så der er mange gemmesteder, og synslinjerne brydes. Låget skal have net, så luften ikke står stille.

Læs mere: Terrarieopbygning og bioaktiv bund

TEMPERATUR

Arten må ikke holdes for varmt. Om dagen passer 18-21 °C, og om natten skal temperaturen falde 4-6 °C, til omkring 13-17 °C. Forskellen mellem årstiderne er kun 1-2 °C. Varme over 25 °C bør undgås, så placér terrariet køligt, og undgå varme fra lyskilderne. I varmt vejr kan en blæser og ekstra sprøjtning holde temperaturen nede.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING

Luftfugtigheden skal være 70-100 %. Morgen og aften er den tæt på 100 % med tåge, mens den midt på dagen må falde til omkring 70 %. Sprøjt eller brug regnanlæg og forstøver et par gange om dagen med regnvand eller osmosevand, og lad terrariet tørre lidt mellem sprøjtningerne, så der ikke dannes skimmel.

Læs mere: Luftfugtighed, sprøjtning og ventilation

VAND OG VANDKVALITET

En vandskål med 1-2 cm vand skal være i terrariet, og et fast vandparti eller små beholdere bruges til haletudserne ved yngel. Brug regnvand eller osmosevand og skift vandet flere gange om ugen. Vandet skal være køligt og rent; naturlige ynglesteder er små skovtjørne og bække. Filter er ikke nødvendigt i en lille skål.

LYS OG UVB

Arten lever på skovbunden, hvor kun lidt lys når ned. LED-lys med planteegnet spektrum og 10-12 timers dagslængde er nok. Behovet for UVB er ikke dokumenteret; en svag UVB-pære (Ferguson-zone 1) kan bruges, når der er gode skjul, så dyrene kan trække væk fra lyset.

Læs mere: Lys og UVB

FODER

Arten tager de almindelige små foderdyr: bananfluer, springhaler, nyklækkede fårekyllinger, de mindste voksmøllarver og ketsjede småinsekter fra engen. Fodr hver anden dag med så meget, som dyrene æder på omkring en time. Drys foderdyrene med kalk med D3 ved hver anden eller tredje fodring og med vitamintilskud en gang om ugen. Unge dyr får de samme foderdyr i mindre størrelse.

Læs mere: Foderdyr: hold og avl Læs mere: Kalk, vitaminer og tilskud

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Arten er dagaktiv og lever på jorden. Hannen er territorial og kalder for at forsvare sit område, så dyrene skal have mange gemmesteder og afbrudte synslinjer. Et par kan holdes sammen; flere hanner i samme terrarie giver strid. Pilegiftfrøer bør ikke håndteres; flyt dem med et rent glas eller en lille beholder ved rengøring.

Avl

KØNSMODENHED OG KØNSBESTEMMELSE

Dyrene er kønsmodne efter 12-13 måneder. Kønnene skelnes bedst på hannens kald; hunnen er lidt større. De første lægninger fra unge hunner er ofte af ringe kvalitet, og æggene angribes let af svamp.

PARRING

Hannen kalder for at tiltrække hunnen. Under parringen holder hannen om hunnens hoved. En periode med kraftigere sprøjtning, der efterligner skovens regn, kan sætte gang i kaldene. Efter æglægningen overtager hannen pasningen af æggene.

ÆG OG HALETUDSER

I terrariet lægger hunnen mange æg i bromelier nær vandkanten. En lægning kan være på over 40 æg. Hannen passer æggene og holder dem fugtige. Når haletudserne klækker, bærer hannen dem på ryggen til vand. Haletudserne er nemme at opdrætte på alger og kan også få færdigfoder til haletudser. De kan opdrættes enkeltvis i små beholdere med køligt, blødt vand, der skiftes ofte. Temperaturen til haletudserne er ikke dokumenteret; hold dem ved samme temperatur som de voksne dyr.

METAMORFOSE

Æggene klækker efter omkring ti dage. Haletudserne bliver til små frøer efter knap to måneder, omkring 55 dage. Når forbenene kommer, sænkes vandstanden, og de forvandlede unger skal have let adgang til land og et fugtigt gemmested.

OPDRÆT AF UNGER

De nyforvandlede unger er små og får springhaler og de mindste bananfluer. De holdes køligt og fugtigt som de voksne, i et terrarie med mos og løv. De kan holdes sammen i en gruppe, så længe der er plads. Vækst og tidspunkt for flytning er ikke dokumenteret.

Sundhed og typiske fejl

Der findes ingen sygdomsbeskrivelser for arten, så de almindelige problemer hos pilegiftfrøer gælder:

- For høj temperatur, som giver stress og svækket immunforsvar. Arten skal holdes køligt.
- Svamp på æggene, især i de første lægninger.
- Chytridsvamp (*Batrachochytrium dendrobatidis*). Nye dyr holdes i karantæne i mindst seks uger.
- Mangel på kalk og vitaminer, som giver svage knogler og dårlig vækst.
- Stillestående luft og snavset vand, som giver bakterier og skimmel.

Levealderen i fangenskab er ikke dokumenteret; tallet i boksen er et skøn ud fra beslægtede arter. Kontakt en dyrlæge med forstand på padder, hvis et dyr holder op med at spise eller taber sig.

Læs mere: Karantæne og hygiejne

Spørg altid dine kloge bekendte

Vejledningen er et godt sted at begynde, men den kan ikke erstatte erfaring. Dyr er forskellige, og meget af det vigtigste lærer man af dem, der har holdt arten i årevis. Tal med en avler, en erfaren holder eller en dyrlæge med forstand på krybdyr og padder, før du anskaffer dyret - og igen, hvis noget ser forkert ud.