herpy

PILEGIFTFRØER

Ecuador Poison Frog

Ameerega bilinguis

Ameerega bilinguis er en lille, dagaktiv pilegiftfrø på 17-23 mm fra regnskovens løvlag i det nordvestlige Amazonas-lavland. Ryggen er sort med røde knopper, og undersiden er lyseblå med sorte tegninger. Arten holdes sjældent, og der findes kun lidt viden om pasningen.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Epipedobates bilinguis* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**17-23 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-26 °C**
Temperatur, nat	**20-22 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. lægning	**4-16**
Klækning	**10-22 dage**
Larvetid	**70-90 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Vogter æggene og bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Alle arter i slægten Ameerega står på CITES liste II, så handel over grænser kræver CITES-papirer. EU-bilaget er ikke aflæst og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Der findes kun lidt viden om pasningen af *Ameerega bilinguis*, men arten holdes i små tal, og grundtallene for terrariet er kendt. Den passes som andre små *Ameerega*-arter fra regnskovens løvlag.

TEMPERATUR

Dagtemperaturen er 25-26 °C, og om natten sænkes den 4-5 grader til 20-22 °C. Arten er knyttet til skovbundens jævne klima og tåler varme dårligt; temperaturer over 28 °C er en risiko, især hvis luften samtidig står stille.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING

Luftfugtigheden er 70-80 % om dagen, med et dyk til omkring 70 % midt på dagen, og tæt på 100 % morgen og aften, gerne med tåge.

VAND OG VANDKVALITET

En flad vandskål med 1-2 cm vand giver frøerne mulighed for at drikke og er nødvendig, hvis der skal yngles, for hannen sætter haletudserne af dér. Skålen skal have en skråning eller sten, så en frø kan komme op igen.

LYS OG UVB

Lyset skal først og fremmest give planterne en dag-natrytme på omkring 12 timer, og her er en LED-lampe til planter nok. UVB er ikke nødvendigt for pilegiftfrøer, så det er valgfrit.

FODER

Foderet er små, levende leddyr: springhaler og bananfluer (*Drosophila melanogaster*), mikrofårekyllinger, sigtet engplankton og små isopoder. Frøen er lille, så større foderdyr som *Drosophila hydei* passer kun til de voksne.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Arten er dagaktiv og lever mest på jorden, men hannerne klatrer gerne op på lidt hævede pladser for at kalde. Den kan holdes i par eller i en gruppe, hvis terrariet er stort nok til, at hannerne kan holde afstand.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Colombia, Ecuador og Peru.