herpy

PILEGIFTFRØER

Cainarachi Poison Frog

Ameerega cainarachi

Ameerega cainarachi er en rødrygget pilegiftfrø på omkring 3 cm, der kun kendes fra bjergfoden omkring Tarapoto i det nordlige Peru. Arten er truet i naturen, og der findes kun lidt viden om pasningen, så vejledningen bygger på klimaet, levestedet og de nære slægtninge *Ameerega bassleri* og *Ameerega pepperi*.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Epipedobates cainarachi; Epipedobates ardens* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**3 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, nat	**19-22 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Kønsmoden	**12-13 mdr.**
Æg pr. lægning	**22-44**
Klækning	**10 dage**
Larvetid	**50-60 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Vogter æggene og bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Truet (EN)**

Alle arter i slægten Ameerega står på CITES bilag II, så handel over grænser kræver CITES-papirer. Arten er opført som truet (EN) hos IUCN. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Der findes kun lidt viden om pasningen af *Ameerega cainarachi*. Arten lever i samme område som *Ameerega bassleri* og *Ameerega pepperi*, og avlstallene er lånt fra dem (se Avl).

TEMPERATUR

Om dagen passer 22-26 °C, og om natten skal temperaturen falde op til 5 °C, til omkring 19-22 °C. Forskellen mellem årstiderne er kun 1-2 °C. Der er ingen vinterhvile.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING

Luftfugtigheden skal være 70-100 %: omkring 70 % midt på dagen og tæt på 100 % med tåge morgen og aften. Sprøjt eller brug regnanlæg og forstøver et par gange om dagen.

VAND OG VANDKVALITET

En lav vandskål med 1-2 cm vand er nok, og den skal være let at komme ind og ud af. Brug regnvand, osmosevand eller afkloreret postevand, og skift vandet hver anden dag, så der ikke samler sig bakterier.

LYS OG UVB

Lyset skal først og fremmest dække planternes behov: LED-lys til plantevækst i 10-12 timer om dagen med en tydelig nat. Behovet for UVB er ikke dokumenteret; en svag UVB-lampe (Ferguson-zone 1) er valgfri.

FODER

Frøerne tager de almindelige små foderdyr: bananfluer (*Drosophila melanogaster* og *Drosophila hydei*), springhaler, små isopoder, nyklækkede fårekyllinger, de mindste voksmøllarver og ketsjede småinsekter fra engen.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Ameerega cainarachi er dagaktiv og holder til på skovbunden. Hannerne i slægten er territoriale og kalder fra faste pladser. Et par er den sikre holdform; flere hanner sammen kan give stress og slagsmål, især i et lille terrarie.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Peru.