herpy

PILEGIFTFRØER

**Yurimaguas Poison Frog**

# *Ameerega hahneli*

*Ameerega hahneli* er en lille, dagaktiv pilegiftfrø på 17-22 mm med lyse sidestriber og blå bug, som lever i regnskovens løvlag i store dele af Amazonas-lavlandet. Hannen bærer haletudserne til rindende vand, og haletudserne kræver strøm i vandet. Arten er almindelig i naturen, men sjælden i fangenskab.

Familie: Dendrobatidae  Tidligere navn: *Epipedobates hahneli; Dendrobates hahneli*  Udgivet 16. november 2026

## SPECIFIKATIONER

### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **17-22 mm**<br>snude-kloak-længde |
| Levetid | **6-10 år** |
| Aktiv | **Dag** |
| Levevis | **Jordboende** |
| Biotop | **Regnskov** |
| Hudgift i naturen | **Mild** |
| Hudgift i fangenskab | **Ingen**<br>Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe |
| Sværhedsgrad | **Øvet** |

### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **50 × 50 × 50 cm**<br>L × B × H til 4 voksne dyr |
| Temperatur, dag | **23-25 °C** |
| Temperatur, nat | **19-21 °C** |
| Luftfugtighed | **65-90 %** |
| Vand | **Vandskål**<br>dybde 1-2 cm |
| UVB | **Valgfri**<br>Ferguson-zone 1 |
| Kost | **Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)** |
| Holdes | **Parvis eller i gruppe** |

### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Æglæggende** |
| Udvikling | **Haletudserne bæres til vand** |
| Æglægning | **På jorden** |
| Kønsmoden | **7-12 mdr.** |
| Æg pr. lægning | **6-33** |
| Klækning | **4-16 dage** |
| Larvetid | **55-65 dage**<br>fra klækning til metamorfose |
| Larvefoder | **Færdigfoder** |
| Yngelpleje | **Vogter æggene og bærer haletudserne** |

### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Appendiks II** |
| IUCN | **Ikke truet (LC)** |

Alle arter i slægten Ameerega står på CITES bilag II, så handel over grænser kræver CITES-papirer. Opdrættede dyr bør sælges med dokumentation for afstamning. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet.

## Pasning i korte træk

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Der findes kun begrænset viden om pasningen af *Ameerega hahneli*, og kravene kan variere mellem de forskellige former og mulige skjulte arter. *Ameerega trivittata* lever i samme del af Amazonas og er bedre kendt i fangenskab. |
| **TEMPERATUR** | Om dagen passer omkring 25 °C og om natten omkring 19 °C. Lysrør uden for terrariet kan levere både lys og den nødvendige varme. Over 28 °C er der risiko for stress; køl med en blæser og ekstra sprøjtning. |
| **LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING** | Luftfugtigheden skal være 65-90 %. Sprøjt eller brug regnanlæg tre gange om dagen med osmosevand, gerne blandet med lidt postevand (omkring 15 %), og lad løvlaget tørre lidt mellem sprøjtningerne, så der ikke dannes skimmel. |
| **VAND OG VANDKVALITET** | Der skal altid være lidt vand at gå til, fx i drænrenden eller en lav vandskål med 1-2 cm vand. I tørtiden tømmes renden ikke, så dyrene stadig har adgang til vand. |
| **LYS OG UVB** | Lyset kan være lysrør eller LED med planteegnet spektrum i 10-12 timer. UVB er ikke nødvendigt; en svag UVB-pære (Ferguson-zone 1) kan bruges, når der er skjul, så dyrene kan trække væk fra lyset. |
| **FODER** | Den lille bananflue (*Drosophila melanogaster*) er det vigtigste foder. Voksne dyr tager også den store bananflue (*Drosophila hydei*), men springer den ofte over, fordi den er lidt for stor. |
| **ADFÆRD OG HÅNDTERING** | Arten er dagaktiv og lever på jorden, men er mest aktiv tidligt om morgenen og sidst på eftermiddagen og om aftenen; resten af dagen er den mere sky. |
| **OPRINDELIG UDBREDELSE** | Brasilien, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Fransk Guyana og Surinam. |