herpy

PILEGIFTFRØER

Niceforo's Poison Frog

Ameerega ingeri

Ameerega ingeri er en lille, dagaktiv pilegiftfrø på 20-27 mm fra foden af Andes i det sydlige Colombia. Ryggen er ensfarvet mørk, flankerne har mørkeblå pletter, og i armhulerne og på læggene sidder klare orange pletter. Arten holdes næppe, så pasningen bygger på klimaet i udbredelsesområdet og på beslægtede arter.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates ingeri; Epipedobates ingeri; Phyllobates ingeri*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**20-27 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-26 °C**
Temperatur, nat	**20-22 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. lægning	**4-16**
Klækning	**10-22 dage**
Larvetid	**70-90 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Utilstrækkelige data (DD)**

Alle arter i slægten Ameerega står på CITES bilag II, så handel over grænser kræver CITES-papirer. Arten er opført som utilstrækkeligt kendt (DD) hos IUCN. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes næsten ingen viden om pasningen af *Ameerega ingeri*, og arten holdes næppe. Pasningen bygger på klimaet ved bjergfoden, som er varmt og fugtigt hele året, og på skovbundens tykke løvlag.
TEMPERATUR	Hold terrariet på 24-26 °C om dagen, og lad temperaturen falde til 20-22 °C om natten. Temperaturen må ikke komme over 28 °C, for frøer tåler varme dårligt.
LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING	Luftfugtigheden skal være 70-80 % midt på dagen og tæt på 100 % morgen og aften. Et regnanlæg eller en forstøver med timer er det nemmeste; ellers forstøves to til tre gange om dagen med osmosevand eller regnvand.
VAND OG VANDKVALITET	Giv en lav vandskål med 1-2 cm vand, så frøerne let kommer op af den, og med sten eller mos i kanten. Brug osmosevand, regnvand eller afkloreret postevand, og skift det ofte.
LYS OG UVB	Lyset er først og fremmest til planterne: 10-12 timer om dagen med LED-lys med planteegnet spektrum. Det er ikke dokumenteret, at *Ameerega ingeri* har brug for UVB.
FODER	I naturen lever *Ameerega ingeri* mest af små myrer og andre små leddyr fra løvlaget.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Ameerega ingeri* er dagaktiv og mest aktiv om formiddagen. Den lever på jorden i løvlaget, men sover gerne på blade et stykke over jorden, så planter med brede blade er en fordel.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Colombia.