herpy

PILEGIFTFRØER

Manu Poison Frog

Ameerega macero

Ameerega macero er en lille, dagaktiv pilegiftfrø på 24-30 mm fra regnskovene omkring Manu i det sydøstlige Peru og det vestlige Brasilien. Hoved og ryg er klart røde, flankerne sorte med en gul stribe, og bugen er blå med sort netmønster. Arten holdes sjældent, og der findes kun lidt viden om pasningen.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Epipedobates macero* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**2-3 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Temperatur, nat	**21-25 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. lægning	**4-16**
Klækning	**10-22 dage**
Larvetid	**70-90 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Vogter æggene og bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Alle arter i slægten Ameerega står på CITES liste II, så handel over grænser kræver CITES-papirer. EU-bilaget er ikke aflæst og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Der findes kun lidt viden om pasningen af *Ameerega macero*. Arten passes som den lige så store *Ameerega petersi*, som den længe er blevet forvekslet med, og tallene for terrarie og klima er lånt derfra.

TEMPERATUR

Dagtemperaturen er 25-28 °C, og om natten sænkes den 3-4 grader til 21-25 °C. Dyr fra de højere dele af udbredelsen tåler køligere nætter, og den lave ende af intervallet passer bedst. Vinterhvile er ikke nødvendig.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING

Luftfugtigheden skal ligge på 70-100 %: tæt på 100 % morgen og aften, gerne med tåge, og omkring 70-80 % midt på dagen. Sprøjt med osmose- eller regnvand morgen og aften, eller brug et tåge- eller regnanlæg på timer.

VAND OG VANDKVALITET

En lav vandskål på 1-2 cm vand er nok. Skålen skal være så lav, at en unge kan komme op af den, og have sten eller mos i kanten. Skift vandet ofte, og rengør skålen med varmt vand uden sæbe.

LYS OG UVB

Giv et LED-lys med planteegnet spektrum i 10-12 timer om dagen. UVB er ikke nødvendigt for pilegiftfrøer; et svagt UVB-lys (Ferguson-zone 1) er valgfrit. Giv frøerne skygge og skjul, så de kan trække væk fra lyset.

FODER

I naturen æder frøen myrer, biller og små larver på 2-7 mm. I terrariet bruges vingeløse bananfluer (*Drosophila melanogaster* og *D. hydei*), springhaler, små isopoder, mikrofårekyllinger og sigtet engplankton.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Hannerne kalder fra jorden eller fra lave stammer og forsvarer formentlig små territorier, som slægtningene gør. I naturen kan der leve omkring ti voksne pr. 1.000 m² langs en bæk.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Peru og Brasilien.