herpy

PILEGIFTFRØER

# *Ameerega pepperi*

*Ameerega pepperi* er en lille, sort pilegiftfrø med gule striber og røde, orange eller gule tegninger fra det centrale Peru. Den lever ved bække i skov i 380-1.000 m højde og er sårbar på grund af rydning. Der findes kun lidt viden om pasningen, som derfor bygger på levestedet og nære slægtninge.

Familie: Dendrobatidae  Udgivet 16. november 2026

## SPECIFIKATIONER

### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **3 cm**<br>snude-kloak-længde |
| Levetid | **8-12 år** |
| Aktiv | **Dag** |
| Levevis | **Jordboende** |
| Biotop | **Regnskov og vådområde** |
| Hudgift i naturen | **Mild** |
| Hudgift i fangenskab | **Ingen**<br>Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe |
| Sværhedsgrad | **Erfaren** |

### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Æglæggende** |
| Udvikling | **Haletudserne bæres til vand** |
| Æglægning | **På jorden** |
| Æg pr. lægning | **22-44** |
| Larvetid | **35-60 dage**<br>fra klækning til metamorfose |
| Larvefoder | **Færdigfoder** |
| Yngelpleje | **Vogter æggene og bærer haletudserne** |

### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **60 × 45 × 45 cm**<br>L × B × H til 2 voksne dyr |
| Temperatur, dag | **21-25 °C** |
| Temperatur, nat | **18-21 °C** |
| Luftfugtighed | **75-100 %** |
| Vand | **Vandskål**<br>dybde 1-2 cm |
| UVB | **Valgfri**<br>Ferguson-zone 1 |
| Kost | **Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)** |
| Holdes | **Parvis** |

### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Appendiks II** |
| IUCN | **Sårbar (VU)** |

Alle arter i slægten Ameerega står på CITES bilag II, så handel over grænser kræver CITES-papirer. Arten er opført som sårbar (VU) hos IUCN. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet.

## Pasning i korte træk

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Der findes kun lidt viden om pasningen af *Ameerega pepperi*. Arten lever ved bække i fugtig skov i 380-1.000 m højde. |
| **TEMPERATUR** | Temperaturen er ikke dokumenteret for arten; 21-25 °C om dagen og 18-21 °C om natten ligger mellem tallene for *Ameerega bassleri* og *Ameerega hahneli*. Temperaturen må ikke komme over 27 °C, da pilegiftfrøer tåler varme dårligt. |
| **LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING** | Luftfugtigheden skal være 75-100 %. Sprøjt 1-3 gange dagligt med regnvand eller osmosevand, eller brug et regnanlæg, så løvlaget bliver fugtigt, men ikke vandmættet. Overskydende vand skal kunne løbe af i drænlaget. |
| **VAND OG VANDKVALITET** | En lav vandskål med 1-2 cm vand og en sten eller gren som landgang er tilstrækkelig. Brug regnvand, osmosevand eller afkloreret vand og skift det hver 2-3 dag. |
| **LYS OG UVB** | Giv plantevenligt lys i 10-12 timer dagligt, med skygge og skjul. UVB er ikke dokumenteret som nødvendigt for arten, men en svag UVB-kilde (Ferguson-zone 1) kan bruges. Pas på, at lyset ikke varmer terrariet op. |
| **FODER** | *Ameerega pepperi* er lille og tager små foderdyr: bananfluer (mest *Drosophila melanogaster*, mindre *Drosophila hydei*), springhaler og små isopoder. Fodr hver eller hver anden dag med så meget, som dyrene æder på en time. |
| **ADFÆRD OG HÅNDTERING** | Hannerne er territoriale og kalder fra sten. Arten holdes bedst som par i et terrarie med mange skjul. Frøer bør ikke håndteres, fordi huden er sart, og håndtering stresser dyrene. Flyt dem med et plastbæger ved rengøring. |
| **OPRINDELIG UDBREDELSE** | Peru. |