herpy

PILEGIFTFRØER

Ameerega pepperi

Ameerega pepperi er en lille, sort pilegiftfrø med gule striber og røde, orange eller gule tegninger fra det centrale Peru. Den lever ved bække i skov i 380-1.000 m højde og er sårbar på grund af rydning. Der findes kun lidt viden om pasningen, som derfor bygger på levestedet og nære slægtninge.

Familie: Dendrobatidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**3 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**8-12 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 45 × 45 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-25 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**75-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. lægning	**22-44**
Larvetid	**35-60 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Færdigfoder**
Yngelpleje	**Vogter æggene og bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Alle arter i slægten Ameerega står på CITES bilag II, så handel over grænser kræver CITES-papirer. Arten er opført som sårbar (VU) hos IUCN. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet.

Om arten

Ameerega pepperi er en lille pilegiftfrø på omkring 3 cm. Hannerne måler omkring 29 mm fra snude til kloak, hunnerne 31-34 mm. Ryggen er sort med røde, orange eller gule tegninger, mest mod hovedet. To gule striber løber fra øjnene ned langs kroppen, og to gule læbestriber starter ved næseborene. Bugen er mørkeblå med sorte tegninger, benene er sorte eller mørkegrønne, og bagbenene er stribede. Dyr fra syd har mere rødt, dyr fra nord mere gult og orange. Der findes flere lokale former, fx 'Chumanza' og 'Río Abiseo'.

Arten blev beskrevet i 2009 af Jason Brown og Evan Twomey og er opkaldt efter den canadiske naturbeskytter Mark Pepper. Den ligner *Ameerega bassleri*, *Ameerega cainarachi* og *Ameerega yoshina* så meget, at hannens kald er det sikreste kendetegn.

Slægtens frøer får alkaloiderne i huden fra føden. Vildfangne dyr regnes derfor for milde, mens dyr, der fodres med foderdyr fra kultur, ikke er giftige. Vask altid hænder efter kontakt.

Læs mere: Foderdyr: hold og avl Læs mere: Køb af dyr: opdræt, vildfang og transport

Udbredelse og levested

Ameerega pepperi findes i det centrale Peru. Typelokaliteten ligger i regionen San Martín, 2 km nordøst for San Francisco i provinsen Tocache, i 980 m højde. Arten findes fra 380 til 1.000 m, bl.a. ved Río Abiseo, i Huallaga-dalen og i Parque Nacional Cordillera Azul. Udbredelsen kendes kun fra få lokaliteter.

> **Oprindelig udbredelse:** Peru.

LEVESTED

Ameerega pepperi lever i uforstyrret og sekundær skov på de østlige Andesskråninger og ved foden af dem. De voksne gemmer sig ved store sten nær bække og findes på jorden ved små vandfald. Hannerne sidder på sten ved bækkene og kalder; hunnerne lægger æggene i løvlaget, og hannerne vogter dem. Haletudserne lever i langsomme hvirvler og i pytter ved bredden. Klimaet i denne højde er fugtigt hele året.

Skoven ryddes til kaffe, bananer og coca, især i Huallaga-dalen.

Læs mere: Opdræt af haletudser

Pasning

TERRARIET

Der findes kun lidt viden om pasningen af *Ameerega pepperi*. Arten lever ved bække i fugtig skov i 380-1.000 m højde. *Ameerega bassleri* lever i samme del af Peru i samme højder og er bedre kendt i fangenskab; *Ameerega cainarachi* og *Ameerega hahneli* er også nære slægtninge. Pasningen af haletudserne er lånt fra *Ameerega hahneli*, hvis haletudser også lever i rindende vand.

Et par skal have mindst 60 × 45 × 45 cm. Bunden bygges med drænlag, fugtspærre og fugtig jord med et tykt løvlag. Arten lever ved bække og store sten, så indret med flade sten, korkbark og grene som skjul og kaldepladser til hannen. Giv mange gemmesteder, mos og planter, der trives fugtigt, og sørg for ventilation, så luften ikke står stille. Fjern gammelt foder og skimmel, og skift løvlaget jævnligt.

Læs mere: Terrarieopbygning og bioaktiv bund

TEMPERATUR

Temperaturen er ikke dokumenteret for arten; 21-25 °C om dagen og 18-21 °C om natten ligger mellem tallene for *Ameerega bassleri* og *Ameerega hahneli*. Temperaturen må ikke komme over 27 °C, da pilegiftfrøer tåler varme dårligt. Om sommeren kan en blæser eller et køligt rum være nødvendig. Der er ingen vinterhvile.

Læs mere: Vinterhvile og årstider

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING

Luftfugtigheden skal være 75-100 %. Sprøjt 1-3 gange dagligt med regnvand eller osmosevand, eller brug et regnanlæg, så løvlaget bliver fugtigt, men ikke vandmættet. Overskydende vand skal kunne løbe af i drænlaget. Efter sprøjtning skal luften bevæges, så den ikke står stille. Tørt løv og tør jord er tegn på for lav fugt.

Læs mere: Luftfugtighed, sprøjtning og ventilation

VAND OG VANDKVALITET

En lav vandskål med 1-2 cm vand og en sten eller gren som landgang er tilstrækkelig. Brug regnvand, osmosevand eller afkloreret vand og skift det hver 2-3 dag. Padder optager stoffer gennem huden, så brug aldrig rengøringsmidler i terrariet. Haletudser i naturen lever i bækkens langsomme vandhvirvler og pytter, så rindende eller let bevæget vand er bedre end stillestående.

LYS OG UVB

Giv plantevenligt lys i 10-12 timer dagligt, med skygge og skjul. UVB er ikke dokumenteret som nødvendigt for arten, men en svag UVB-kilde (Ferguson-zone 1) kan bruges. Pas på, at lyset ikke varmer terrariet op.

Læs mere: Lys og UVB

FODER

Ameerega pepperi er lille og tager små foderdyr: bananfluer (mest *Drosophila melanogaster*, mindre *Drosophila hydei*), springhaler og små isopoder. Fodr hver eller hver anden dag med så meget, som dyrene æder på en time. Drys med kalk ved hver anden fodring og med vitaminer 1-2 gange om ugen. Unger tager de mindste foderdyr, fx springhaler, de første 3 måneder.

Læs mere: Kalk, vitaminer og tilskud

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Hannerne er territoriale og kalder fra sten. Arten holdes bedst som par i et terrarie med mange skjul. Frøer bør ikke håndteres, fordi huden er sart, og håndtering stresser dyrene. Flyt dem med et plastbæger ved rengøring.

Avl

KØNSMODENHED OG KØNSBESTEMMELSE

Hunnerne er lidt større end hannerne, og kun hannerne kalder. Alderen ved kønsmodenhed er ikke dokumenteret; hos nære slægtninge er den omkring et år. Et sikkert par fås ved at opdrætte flere unge sammen.

PARRING

Hannerne sidder på sten ved bækkene og kalder til hunnerne. Hvad der sætter gang i parringen i terrariet, er ikke dokumenteret; stabile, fugtige forhold og sprøjtning, der efterligner regn, virker hos slægtningene. Giv parret mange skjul.

ÆG OG HALETUDSER

Hunnen lægger 22-44 æg i løvlaget, og hannen vogter dem. Hannen bærer formentlig haletudserne til vandet som hos resten af slægten. Haletudserne skal have rent vand med en svag strøm, et ugentligt vandskift og algetabletter som foder.

METAMORFOSE

Klæktiden er ikke dokumenteret for arten. Haletudserne kan blive til små frøer på blot fem uger, men omkring to måneder er almindeligt hos slægten. Når forbenene kommer, sænkes vandet, og der skal være let adgang til fugtigt land, så den nyforvandlede unge kan kravle op.

OPDRÆT AF UNGER

De nyforvandlede unger er meget små. Hold dem i et lille terrarie med fugtigt løvlag og mos. Giv de mindste foderdyr, fx springhaler og små bananfluer, og drys med kalk. De kan efter 3 måneder tage større bananfluer og flyttes til et større terrarie.

Sundhed og typiske fejl

Der er ikke dokumenteret sygdomme, der er særlige for *Ameerega pepperi*. Typiske fejl i pasningen er:

- For høj temperatur eller stillestående luft.
- For lav fugt, der tørrer huden.
- Mangel på kalk og vitaminer, som giver svage knogler og dårlig vækst.
- Stillestående vand til haletudser.
- Chytridsvamp (*Batrachochytrium dendrobatidis*). Nye dyr holdes i karantæne i mindst seks uger.

Levealderen i fangenskab er ikke dokumenteret; tallet i boksen er et skøn ud fra beslægtede arter. Opsøg en dyrlæge med forstand på padder, hvis en frø bliver sløv, taber sig eller holder op med at spise.

Læs mere: Karantæne og hygiejne

Spørg altid dine kloge bekendte

Vejledningen er et godt sted at begynde, men den kan ikke erstatte erfaring. Dyr er forskellige, og meget af det vigtigste lærer man af dem, der har holdt arten i årevis. Tal med en avler, en erfaren holder eller en dyrlæge med forstand på krybdyr og padder, før du anskaffer dyret - og igen, hvis noget ser forkert ud.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/pilegiftfroeer/ameerega-pepperi