herpy

PILEGIFTFRØER

Peru Poison Frog

Ameerega petersi

Ameerega petersi er en lille, dagaktiv pilegiftfrø på 24-30 mm fra regnskoven ved foden af Andes i det østlige Peru og det vestlige Brasilien. Ryggen er brun med en lys, skrå sidestribe. Arten holdes sjældent, og der findes kun lidt viden om pasningen.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Epipedobates petersi; Dendrobates petersi* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**2-3 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Temperatur, nat	**21-25 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. lægning	**4-16**
Klækning	**10-22 dage**
Larvetid	**70-90 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Vogter æggene og bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Alle arter i slægten Ameerega står på CITES liste II, så handel over grænser kræver CITES-papirer. EU-bilaget er ikke aflæst og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Der findes kun lidt viden om pasningen af *Ameerega petersi*, men arten holdes i små tal, og grundtallene for terrariet er kendt. Den passes som andre små *Ameerega*-arter fra regnskovens løvlag.

TEMPERATUR

Dagtemperaturen er 25-28 °C, og om natten sænkes den 3-4 grader til 21-25 °C. Udsvinget over året er kun 1-2 grader.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING

Luftfugtigheden skal ligge på 70-100 %: tæt på 100 % morgen og aften, gerne med tåge, og omkring 70-80 % midt på dagen. Sprøjt med osmose- eller regnvand morgen og aften, eller brug et tåge- eller regnanlæg på timer.

VAND OG VANDKVALITET

En lav vandskål på 1-2 cm vand er nok. Skålen skal være så lav, at en unge kan komme op af den, og have sten eller mos i kanten. Skift vandet ofte, og rengør skålen med varmt vand uden sæbe.

LYS OG UVB

Giv et LED-lys med planteegnet spektrum i 10-12 timer om dagen. UVB er ikke nødvendigt for pilegiftfrøer; et svagt UVB-lys (Ferguson-zone 1) er valgfrit. Giv frøerne skygge og skjul, så de kan trække væk fra lyset.

FODER

Kosten består af små levende leddyr fra løvlaget. I terrariet bruges vingeløse bananfluer (*Drosophila melanogaster* og *D. hydei*), springhaler, små isopoder, mikrofårekyllinger, sigtet engplankton og de mindste voksmøllarver.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Hannerne i slægten kalder og forsvarer små territorier. Det er ikke beskrevet, hvordan *Ameerega petersi* opfører sig i grupper, så et par er den sikreste holdform.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Peru og Brasilien.