herpy

PILEGIFTFRØER

Spot-legged Poison Frog

Ameerega picta

Ameerega picta er en lille, dagaktiv pilegiftfrø med mørkebrun ryg, sorte sider med lyse striber og gule til røde pletter på lårene. Den lever på skovbunden fra Amazonas' lavland op i foden af Andes i Bolivia, Peru, Colombia og Brasilien og har en isoleret bestand i Venezuela. Arten holdes kun sjældent, så pasningen bygger på klimaet i udbredelsesområdet og på nære slægtninge.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Epipedobates pictus; Dendrobates pictus* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**22-28 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**8-12 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Erfaren**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. lægning	**15-40**
Klækning	**15-22 dage**
Larvetid	**40-90 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Bærer haletudserne**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-25 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Alle arter i slægten Ameerega står på CITES bilag II, så handel over grænser kræver CITES-papirer. Køb kun dyr, der kan dokumenteres som opdrættede, og gem papirerne. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Ameerega picta*. Arten holdes kun sjældent, og den store højdeudbredelse gør det svært at sige, hvilket klima den enkelte bestand er tilpasset.
TEMPERATUR	Hold terrariet på 21-25 °C om dagen, og lad temperaturen falde 3-4 °C om natten, til 18-22 °C. Udsvinget over året skal være lille, 1-2 °C. Frøer tåler varme dårligt: temperaturer over omkring 28 °C er farlige.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden skal være 70-80 % midt på dagen og tæt på 100 % morgen og aften. Et regnanlæg eller en forstøver med timer er det nemmeste; ellers sprøjtes to til tre gange om dagen med osmosevand eller regnvand.
VAND OG VANDKVALITET	Giv en lav vandskål med 1-2 cm vand, så frøerne let kommer op af den, og med sten eller mos i kanten. Skålen bruges af de voksne, når haletudserne skal sættes af.
LYS OG UVB	Lyset er først og fremmest til planterne: 10-12 timer om dagen med LED-lys med planteegnet spektrum. Det er ikke dokumenteret, at *Ameerega picta* har brug for UVB.
FODER	Frøen lever i naturen af små leddyr. I terrariet består kosten af flyveløse bananfluer (*Drosophila melanogaster* og *D. hydei*), springhaler, små isopoder, mikrofårekyllinger, små voksmøllarver og sigtet engplankton.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Ameerega picta* er dagaktiv og lever mest på jorden. Hannerne i slægten forsvarer små territorier, så et par er den sikreste holdform. Hold ikke to hanner sammen i et lille terrarie.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Bolivia, Brasilien, Peru, Colombia og Venezuela.