herpy

PILEGIFTFRØER

Cordillera Azul Poison Frog

Ameerega rubriventris

Ameerega rubriventris er en lille, mørk pilegiftfrø på 21-25 mm med lyse sidestriber og en rød- eller orangesort marmoreret bug. Den lever kun i skovene ved Cordillera Azul i det centrale Peru og er truet. Arten holdes sjældent, og der findes kun lidt viden om pasningen.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Epipedobates rubriventris* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**21-25 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**50 × 50 × 50 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Temperatur, nat	**21-25 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. lægning	**4-16**
Klækning	**10-22 dage**
Larvetid	**70-90 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Vogter æggene og bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Truet (EN)**

Alle arter i slægten Ameerega står på CITES liste II, så handel over grænser kræver CITES-papirer. IUCN vurderer arten som truet (EN), og den er beskyttet i Peru. EU-bilaget er ikke aflæst og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Der findes kun lidt viden om pasningen af *Ameerega rubriventris*. Klimaet i bjergskovene ved Cordillera Azul er varmt og fugtigt hele året, og arten passes som andre små *Ameerega*-arter fra regnskovens løvlag.

TEMPERATUR

Dagtemperaturen er 25-28 °C, og om natten sænkes den 3-4 grader til 21-25 °C. Temperaturen svinger kun 1-2 grader hen over året, og en vinterhvile er ikke nødvendig.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING

Luftfugtigheden er 70-80 % om dagen, med et dyk til omkring 70 % midt på dagen, og tæt på 100 % morgen og aften, gerne med tåge. Et regnanlæg eller en tågemaskine på timer gør det let; ellers sprøjtes der grundigt morgen og aften.

VAND OG VANDKVALITET

En lav vandskål med 1-2 cm vand er nok, og den skal være nem at komme ind og ud af. Brug regnvand, osmosevand eller afkloreret postevand, og skift vandet hver anden dag, så der ikke samler sig bakterier.

LYS OG UVB

Lyset skal først og fremmest dække planterne: en LED-lampe til plantevækst i 10-12 timer om dagen og en tydelig nat. UVB er ikke nødvendigt for pilegiftfrøer; en svag UVB-lampe (Ferguson-zone 1) er valgfri.

FODER

Frøerne spiser små levende leddyr: bananfluer (*Drosophila melanogaster* og til de voksne også *D. hydei*), springhaler, mikrofårekyllinger, små isopoder og sigtet engplankton.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Ameerega rubriventris er dagaktiv og holder til på skovbunden, men klatrer gerne. Hannen kalder med en fuglelignende piben, oftest 2-3 korte fløjt i træk.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Peru.