herpy

PILEGIFTFRØER

Silverstone's Poison Frog

Ameerega silverstonei

Ameerega silverstonei er en orangerød pilegiftfrø på omkring 4 cm, der kun kendes fra Cordillera Azul på de østlige Andesskråninger i Peru. Den lever i kølig bjergskov omkring 1.300-1.500 m højde, er truet af tab af levested og holdes sjældent. Pasningen kræver et køligt terrarie.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Epipedobates silverstonei; Dendrobates silverstonei; Phobobates silverstonei* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**4-5 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**8-12 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Bjergskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**50 × 50 × 50 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Temperatur, nat	**17-20 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Kønsmoden	**15-16 mdr.**
Æg pr. lægning	**30-45**
Klækning	**30 dage**
Larvetid	**55-60 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Vogter æggene og bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Truet (EN)**

Alle arter i slægten Ameerega står på CITES bilag II, så handel over grænser kræver CITES-papirer. Arten er opført som truet (EN) hos IUCN. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Der findes kun lidt viden om pasningen af *Ameerega silverstonei*. Den bygger på klimaet i bjergskoven omkring 1.300-1.500 m: køligt, fugtigt og stabilt året rundt.

TEMPERATUR

Om dagen passer 20-24 °C; 22-24 °C er den øvre grænse, og 20-21 °C er endnu bedre. Om natten sænkes temperaturen 3-4 °C, til omkring 17-20 °C. Temperaturen må ikke komme over 25 °C.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING

Luftfugtigheden skal være 70-100 %: omkring 70 % midt på dagen og op mod 100 % morgen og aften. Sprøjt 1-3 gange dagligt med regnvand eller osmosevand, eller brug et regnanlæg og eventuelt en tågemaskine.

VAND OG VANDKVALITET

En lav vandskål med 1-2 cm vand er nok. Brug regnvand, osmosevand eller afkloreret vand, og skift det ofte. Vandet skal være køligt ligesom luften. Læg sten eller grene i skålen, så ungerne kan komme op.

LYS OG UVB

Arten lever på skyggefuld skovbund, så lyset skal være moderat, og der skal være skygge. Lysstofrør eller LED med plantevenligt spektrum i 10-12 timer dagligt er nok.

FODER

Ameerega silverstonei tager små til store foderdyr: store bananfluer (*Drosophila hydei*), nyklækkede fårekyllinger, de mindste voksmøllarver og ketsjede småinsekter fra engen. Springhaler og små isopoder supplerer.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Arten er sky og trækker sig ofte ind under løv eller korkbark. Den kan holdes i grupper, men hannerne er territoriale, så hold et par eller en gruppe med flere hunner end hanner.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Peru.