herpy

PILEGIFTFRØER

Three-striped Poison Frog

Ameerega trivittata

Ameerega trivittata er en stor, dagaktiv pilegiftfrø på 4-6 cm fra Amazonas' skovbund. Den er sort med to lysegrønne striber langs siderne, og hannen bærer i en enkelt omgang ofte 15-30 haletudser på ryggen til vand. Frøen kræver et rummeligere terrarie end de små pilegiftfrøer.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Epipedobates trivittatus; Dendrobates trivittatus; Phobobates trivittatus* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**4-6 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Øvet**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Kønsmoden	**12-24 mdr.**
Æg pr. lægning	**15-40**
Klækning	**15-22 dage**
Larvetid	**40-90 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Vogter æggene og bærer haletudserne**

PASNING

Min. terrarie	**70 × 50 × 50 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**23-25 °C**
Temperatur, nat	**19-22 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Alle arter i slægten Ameerega står på CITES bilag II, så handel over grænser kræver CITES-papirer. Opdrættede dyr bør sælges med dokumentation for afstamning. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et terrarie på mindst 70 × 50 × 50 cm (længde, bredde, højde) passer til to voksne *Ameerega trivittata*. Arten er stor og aktiv, hannen vil have plads til et revir, og frøen klatrer gerne, så giv den grene og hævede siddepladser.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen holdes på 23-25 °C, og om natten sænkes den med 3-4 °C til omkring 19-22 °C. Udsvinget over året skal være lille, 1-2 °C.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden skal ligge på 80-90 % det meste af dagen, tæt på 100 % morgen og aften, og den må falde til omkring 70 % midt på dagen. Længere tid under 70 % er farligt, især hvis frøen ikke har adgang til vand.
VAND OG VANDKVALITET	En lav vandskål på 1-2 cm vand er nok. Skålen skal være så lav, at en unge kan komme op af den, og med sten eller mos i kanten. Skål og vand skiftes ofte, og skålen rengøres med varmt vand uden sæbe.
LYS OG UVB	UVB er ikke dokumenteret som nødvendigt for pilegiftfrøer i almindelighed, og for netop denne art er der ingen oplysninger. Et svagt UVB-lys (Ferguson-zone 1) er valgfrit.
FODER	Kosten består af små levende leddyr.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Hannerne kalder højlydt og forsvarer små territorier, mens hunnerne er rolige. Det er ikke dokumenteret, hvordan arten opfører sig i grupper i fangenskab, så par er den sikreste holdform.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Bolivia, Brasilien, Colombia, Guyana, Peru, Surinam og Venezuela.