herpy

PILEGIFTFRØER

Cauca Poison Frog

Andinobates bombetes

Andinobates bombetes er en lille, dagaktiv pilegiftfrø på 17-19 mm fra skyskovene i Colombias Andesbjerge. Den er sort til mørkebrun med røde eller orange tegninger på forkroppen og er afhængig af vandfyldte bromelier. Arten er sårbar i naturen, og der findes kun lidt viden om pasningen.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Ranitomeya bombetes; Dendrobates bombetes; Minyobates bombetes* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**17-19 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Bjergskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 50 × 60 cm** L × B × H til 5 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-25 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**80-100 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. lægning	**1-2**
Klækning	**16-24 dage**
Larvetid	**108-112 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Hele slægten Andinobates står på CITES liste II, så handel over EU's grænser kræver CITES-tilladelser, og dyrene skal kunne dokumenteres som opdrættede. Arten er sårbar i naturen, og vildfangne dyr bør ikke anskaffes.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Andinobates bombetes*. Den bygger på levestedet, en kølig og meget fugtig bjergskov med tykt løvlag og bromelier, og på opdræt i fangenskab i Colombia.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen skal være 22-25 °C, og om natten må den gerne falde til 18-21 °C som i bjergskoven. Hold temperaturen under 27 °C.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden skal være 80-100 % og aldrig under 70 %. Sprøjt to gange om dagen, morgen og eftermiddag, eller brug et tågeanlæg eller regnanlæg med osmosevand eller regnvand.
VAND OG VANDKVALITET	Der er ikke brug for en vandskål; frøerne drikker dråber fra planter og sprøjtevand. Til haletudserne bruges bromelier med vand i bladakslerne eller små plastbægre med 2-3 cm vand.
LYS OG UVB	Lyset er først og fremmest til planterne: plantelys i 10-12 timer om dagen giver dagsrytme og vækst.
FODER	Foderet er små leddyr: springhaler, små bananfluer (*Drosophila melanogaster*), små isopoder og nyklækkede fårekyllinger. Nyforvandlede unger tager kun springhaler.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Andinobates bombetes* er dagaktiv og holder sig lavt i terrariet, i løvlaget og ved bromelierne. Hannerne kalder især om morgenen. Flest æg og den bedste befrugtning fås med flere hunner end hanner, fx to hanner og tre hunner.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Colombia.