herpy

PILEGIFTFRØER

Bocas Poison Frog

Andinobates claudiae

Andinobates claudiae blev beskrevet som den mindste pilegiftfrø: voksne dyr måler kun omkring 13 mm. Den lever i løvlaget i lavlandsskov i Bocas del Toro i det nordvestlige Panama, både på øerne og på fastlandet. Arten er truet, og der findes næsten ingen viden om pasningen.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Ranitomeya claudiae* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**13 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Ekspert**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-25 °C**
Temperatur, nat	**19-22 °C**
Luftfugtighed	**80-100 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. lægning	**1-8**
Larvetid	**60-80 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Færdigfoder**
Yngelpleje	**Bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Truet (EN)**

Hele slægten Andinobates står på CITES liste II, så handel over EU's grænser kræver CITES-tilladelser, og sælgeren bør kunne dokumentere, at dyrene er lovligt opdrættet. Arten er truet (IUCN: EN). EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der findes næsten ingen viden om pasningen af *Andinobates claudiae*. Pasningen bygger på levestedet: varm, fugtig lavlandsskov med regn det meste af året og et tykt løvlag.

TEMPERATUR
Dagtemperaturen skal være 22-25 °C og natten 19-22 °C. Tallene er lånt fra *Ranitomeya imitator*, som trives bedst ved 21-24 °C og tåler 18-27 °C. Over 29 °C er farligt, så terrariet må ikke stå i sol eller tæt på en varmekilde.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING
Luftfugtigheden skal være 80-100 %. Sprøjt terrariet 1-2 gange om dagen med regnvand eller osmosevand, så løvet holdes fugtigt, eller brug et regnanlæg på timer. Bunden skal være fugtig, men aldrig stå under vand.

VAND OG VANDKVALITET
De voksne frøer behøver ingen vandskål; de får vand gennem huden fra sprøjtning og det fugtige løv.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og lever i skygge på skovbunden. LED-belysning i omkring 12 timer om dagen er nok til planterne. UVB er ikke nødvendigt; et svagt UVB-lys i Ferguson-zone 1 kan bruges, hvis der er rigeligt med skygge.

FODER
Andinobates claudiae er så lille, at foderdyrene skal være de mindste, der findes: springhaler, små vingeløse bananfluer (*Drosophila melanogaster*) og små isopoder. Selv almindelige bananfluer kan være for store.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Arten er dagaktiv og holder sig i løvlaget og ved skjulestederne. Hannerne kalder fra faste steder og forsvarer deres område, så holdformen er et par. Flere hanner i samme terrarie giver stress og kampe.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Panama.